


# Outil d'aide à la décision pour les employés, médecins et gestionnaires du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean



## Présence de symptômes





Mise à jour : 21 juin 2021



# Trajectoire sommaire de l'employé dépisté ou suivi dans le cadre d'une enquête épidémiologique

Une trajectoire différente s'applique aux employés dépistés dans le cadre du dépistage ciblé.



 <b>Fièvre</b>	 <b>Symptômes généraux</b>	 <b>Symptômes respiratoires</b>	 <b>Symptômes gastro-intestinaux</b>
<b>Enfant de 0-5 ans :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• température <b>rectale</b> de 38,5 °C (101,3 °F) et plus</li></ul> <b>Enfant de 6 ans et plus :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• température <b>buccale</b> de 38,1 °C (100,6 °F) et plus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perte soudaine d'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût</li><li>• Grande fatigue</li><li>• Perte d'appétit importante</li><li>• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toux (nouvelle ou aggravée)</li><li>• Essoufflement, difficulté à respirer</li><li>• Mal de gorge</li><li>• Nez qui coule ou nez bouché</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nausées</li><li>• Vomissements</li><li>• Diarrhée</li><li>• Maux de ventre</li></ul>