Drainage d'abcès ou collection liquidienne

Hôpital de Chicoutimi

Qu'est-ce que c'est?

Votre médecin vous a prescrit un drainage. Cet examen consiste à retirer du liquide qui est présent dans un endroit précis. Cette procédure a pour but de vous soulager (thérapeutique) de tout ce liquide qui s'accumule. Le liquide retiré pourra aussi être analysé afin d'établir un potentiel diagnostic et ainsi cibler le bon traitement. Un petit drain ou une aiguille sera installé par ponction sous guidage échographique ou à l'aide du rayonnement X. Le liquide pourra alors être aspiré à l'aide d'une seringue ou un drain sera laissé en place et le liquide s'écoulera par gravité.



- Ces examens se font sur rendez-vous seulement.
- La durée de l'examen peut varier.
 Prévoyez donc une journée complète pour votre intervention.
- Les résultats de votre examen seront transmis à votre médecin.
- S'il vous est impossible de vous présenter à votre rendez-vous, avisez-nous au 418 541-1234, poste 2344.

Préparation à l'examen

Les informations suivantes sont très importantes à savoir pour l'équipe médicale. Il faudra nous indiquer lors de l'appel de votre rendez-vous si vous :

- êtes allergique à certains médicaments;
- êtes diabétique;
- êtes allergique à l'iode;
- prenez des médicaments pour éclaircir le sang (anticoagulants ou antiplaquettaires).

N.B. Vous devez demeurer à jeun à partir de minuit la veille de votre examen.

Le jour de l'examen

- Prenez vos médicaments habituels du matin avec un peu d'eau, sauf ceux qu'on vous a demandé de ne pas prendre (ex. : ceux pour éclaircir le sang).
- Ne portez aucun bijou ou piercing. Laissez les objets de valeur à la maison.
- Apportez vos cartes d'assurance maladie et d'hôpital ainsi que votre liste de médicaments. Si vous n'avez pas de carte d'hôpital, présentez-vous 15 minutes avant l'heure de votre rendez-vous au guichet n° 4 de la clinique externe pour l'obtenir.
- Vous serez admis en médecine de jour au 5^e étage de l'hôpital de Chicoutimi. Présentez-vous là-bas, une heure avant le rendez-vous.
- Une infirmière vous accueillera pour faire votre préparation à l'examen.



- Vous serez dirigé vers l'imagerie médicale où vous passerez votre examen. Le technologue vous expliquera plus en détail le déroulement de votre intervention. Vous serez confortablement installé sur une table où une désinfection du site ponction sera effectuée.
- Une échographie de votre collection liquidienne est réalisée pour localiser et s'assurer de la présence de liquide.
- Le radiologiste d'intervention fera une anesthésie locale. Puis il ponctionnera la collection à l'aide d'un drain ou d'une aiguille.
- Le tout étant fait stérilement, il est important de ne rien toucher.
- Il peut arriver que l'utilisation de rayons X et de colorant iodé soit nécessaire pour mieux imager l'endroit à ponctionner.
- Si nécessaire, des prélèvements seront faits et le liquide sera retiré par succion à l'aide d'une seringue ou laissé en drainage libre avec un sac à l'extrémité.
- Un pansement sera installé pour fixer le cathéter et le protéger s'il demeure en place.
- Un sac ou un bouchon seront reliés au cathéter pour éviter qu'il ne coule.
- Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler au technologue ou au radiologiste.

Une fois l'examen terminé

- Vous retournerez en médecine de jour au 5e étage pour une surveillance d'environ une heure.
- Pour éviter un saignement ou un hématome, il faudra éviter de se lever rapidement après l'intervention.

- Le personnel vérifiera régulièrement vos signes vitaux ainsi que le pansement.
- Vous aurez ensuite votre congé avec des consignes à suivre pour le retour à la maison.

Une fois à la maison

- Limitez vos activités pendant au moins 48 heures
- La région où le drainage a été réalisé sera sensible. Ceci est normal.
- Ne prenez pas de médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique (ex. : ASA, Advil, antiinflammatoire) pour 24 h.
- Vous pouvez prendre de l'acétaminophène (Tylenol) aux 4 à 6 h si besoin.
- Il est important de garder le pansement au sec durant 24 h.
- Il est permis de prendre une douche après le retrait du pansement.
- Évitez la baignade pendant au moins 7 jours, le but étant d'éviter les infections.
- Une ecchymose peut apparaître au site de ponction accompagnée d'un léger saignement.

Consultez à l'urgence si votre douleur augmente malgré la prise de calmants.
Consultez également si vous avez un saignement important de la plaie, une chaleur, une rougeur ou un écoulement jaunâtre ou verdâtre au site de ponction ou encore si vous faites de la fièvre (38 °C ou plus) pendant 24 h.

FI-DSP-DrainageAbces03-24.pdf | Une collaboration de la Direction des services professionnels et de la Direction adjointe des communications et des affaires publiques du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce document est la propriété du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toute modification est interdite sans autorisation. La reproduction du document tel quel est permise. ©Gouvernement du Québec, 2024

