Diagnostic et prise en charge du placenta praevia

Échographie transabdominale à 18-23 semaines

- Bord du placenta à 20 millimètres ou plus de l'orifice interne?

NON → **Effectuer une échographie transvaginale immédiatement.**

- Mesurer et indiquer la distance : Bordure inférieure du placenta à X millimètres **de** l'orifice cervical interne OU Bordure inférieure du placenta **empiétant** de X millimètres sur l'orifice cervical interne.
- Échographie Doppler pulmonaire et identification de l'insertion du cordon placentaire afin de détecter un vasa praevia possible.

- La bordure inférieure du placenta atteint ou traverse l'orifice interne?

OUI → **Emplacement normal du placenta**

NON

- **Bord du placenta à plus de 20 millimètres de l'orifice interne.**

Placenta normalement positionné

- Aucune autre échographie requise.

- **Bord du placenta à 20 millimètres ou moins de l'orifice cervical.**

Placenta inséré bas

OUI → **Placenta praevia**

- Évaluer l'insertion du cordon si cela n'a pas déjà été fait
- Envisager un dépistage du vasa praevia.

Perles cliniques

- plus de 10 mm de diamètre : peu probable que l'orifice soit traversé à terme
- moins de 10 millimètres de diamètre : traversera probablement l'orifice à terme

- Prendre en compte les signes, les facteurs de risque, les soupçons de spectre du placenta accreta (SPA), c.-à-d. cicatrice césarienne, placenta antérieur/praevia/inséré bas.

OUI

Diagnostic de spectre du placenta accreta

- Renvoyer aux soins tertiaires pour une césarienne avant le travail
- En cas de doutes – Aiguillage à un spécialiste OU aiguillage vers une échographie T1 ou T2 / un suivi avec un spécialiste en imagerie.
- Une considération et un diagnostic précoces sont optimaux

NON

- Échographie de suivi et réévaluation à 32 semaines pour un vasa praevia possible.

- Bordure inférieure du placenta à plus de 20 mm de l'orifice interne et aucun signe de vasa praevia.

NON

- **Échographie transvaginale de suivi à 36 semaines**

- Bordure inférieure du placenta à 10 mm ou moins de l'orifice interne ou empiétant sur l'orifice ou vasa praevia.

Césarienne avant le travail

- Bordure inférieure du placenta à 11-20 mm de l'orifice interne et aucun signe de vasa praevia.

- Bordure inférieure du placenta à plus de 20 mm de l'orifice interne et aucun signe de vasa praevia.

Envisager le travail dans un centre disposant d'un bon soutien

- Avec capacité d'accoucher par césarienne, accès aux intraveineuses, banque de sang et précautions contre les HPP

OUI

Aucune contre-indication au travail

- Précautions contre les HPP

SG. | ampro OB

© 2026 Salus Global Corporation. Tous droits réservés 20437 v.03 03/2026