


Collection
PORTRAIT DE SANTÉ
SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN ET TERRITOIRES SOCIO SANITAIRES

Tableau synoptique des indicateurs socio-sanitaires par territoire

Le Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean
et ses territoires socio-sanitaires



Cette version mise à jour du *Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires* a été produite par le Service recherche, connaissance, surveillance de la Direction de santé publique.

Coordination :

Ann Bergeron, M.D.

Révision du texte et des indicateurs :

René Lapierre, agent de recherche sociosanitaire
Régis Couture, agent de recherche sociosanitaire

Relecture :

Marie-Claude Clouston, agente de recherche sociosanitaire
Myriam Duplain, agente de recherche sociosanitaire

Traitement des données et des indicateurs :

Valérie Larouche, programmeuse

Traitement de texte :

Anne-Pascale Maltais, secrétaire

Le document original (Tableau synoptique, version du 17 octobre 2003) a été produit grâce à la contribution des personnes suivantes :

Conditions démographiques et Conditions socioculturelles
France Markowski, René Lapierre

Conditions socio-économiques
René Lapierre

Environnement physique
Michel Savard, Marc Fiset

Environnement social et adaptation sociale
France Markowski, René Lapierre, Régis Couture

Habitudes de vie, facteurs de risque et comportements préventifs
Régis Couture, France Markowski

Services de santé
Marc Fiset, Germain Couillard, Régis Couture, René Lapierre

État de santé global
France Markowski, Régis Couture, René Lapierre

État de santé physique
René Lapierre, Régis Couture, Germain Couillard, France Markowski, Marc Fiset

État de santé mentale
Régis Couture

Pour obtenir un exemplaire de ce document, faites parvenir votre commande

par télécopieur : (418) 549-9710

ou par la poste : Agence de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Centre de documentation
930, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec)
G7H 7K9

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	5
INTRODUCTION	6
NOTES MÉTHODOLOGIQUES	7
CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES	
1. Population selon l'âge (%) 2004	9
Mouvement de la population	
2. Taux d'accroissement de la population (%) 1996 à 2001	9
3. Indice synthétique de fécondité (enfants par femme) Qc : 1997-1999; SLSJ : 1999-2001	9
CONDITIONS SOCIOCULTURELLES	
Modalité de vie	
4. Population de 15 ans et plus vivant seule (%) 2001	10
5. Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (%) 2001	10
6. Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait (%) 2001	10
7. Population selon la langue maternelle (%) 2001	10
8. Immigrants (%) 2001	10
CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES	
Scolarité	
9. a. Population de 20 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur au certificat d'études secondaires (%) 2001	10
b. Population de 20 ans et plus ayant un diplôme universitaire (%) 2001	10
Revenu	
10. Revenu personnel par habitant (moyenne en dollars courants) 2003	10
11. Rapport de dépendance économique (\$ par 100 \$ de revenu d'emploi) 2002	11
12. Population vivant sous le seuil de faible revenu (%) 2001	11
13. Adultes de 18 à 64 ans prestataires du programme d'assistance-emploi (%) 2004	11
14. Répartition des adultes prestataires du programme d'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (%) 2004	11
15. Personnes de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (%) 1999	11
Emploi	
16. Taux d'emploi (%) 2001	12
17. Taux de chômage (%) 2001	12
18. Population active expérimentée selon le secteur d'activité (%) 2001	12

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Qualité de l'eau

19. Population selon la source d'approvisionnement en eau potable (%) Qc : 1999; SLSJ : 2001	12
--	----

ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADAPTATION SOCIALE

Soutien social

20. Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale (%) 1998	12
--	----

Réalités familiales

21. Familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille (%) 2001	12
22. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent selon l'âge (%) 2001	12

Adaptation sociale

23. Taux de grossesse à l'adolescence (p. 1 000) 1997-1998	12
24. Population de moins de 18 ans ayant subi de la violence physique (%) 2000	13
25. Taux d'incidence des nouvelles prises en charge des 0-17 ans dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (p. 1 000) 1993-1999	13
26. Taux de jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois (p. 1 000) 2001	13
27. Taux de crimes contre la personne (p. 100 000) 2001	13

Violence conjugale

28. Taux de victimisation pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus (p. 100 000) 2002	13
29. Taux de victimisation pour violence conjugale chez les hommes de 12 ans et plus (p. 100 000) 2002	13
30. Femmes de 18 ans et plus ayant subi de la violence conjugale (p. 1 000) 2000	13
31. Hommes de 18 ans et plus ayant subi de la violence conjugale (p. 1 000) 2000	13

HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS

Alimentation

32. Population de 18 à 74 ans percevant avoir des habitudes alimentaires médiocres (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000	14
---	----

Tabagisme

33. Fumeurs actuels de 18 ans et plus (%) 2000	14
34. Fumeurs quotidiens de 18 ans et plus dont l'âge initial du tabagisme quotidien est inférieur à 15 ans (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000	14
35. Fumeurs de 25 cigarettes ou plus par jour chez les 18 ans et plus (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000	14
36. Population de 18 ans et plus ayant cessé de fumer (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000	14

Consommation d'alcool

37. Population de 18 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000	14
38. Population de 18 ans et plus présentant une consommation élevée d'alcool 5 fois ou plus au cours d'une année (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000	15

Poids corporel

39. Population de 18 ans et plus présentant un excès de poids (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000 15

Activité physique40. Population de 18 ans et plus ayant des activités physiques de loisir insuffisantes (%)
Qc : 1998; SLSJ : 2000 15**Grossesses**

41. Taux de césarienne (pour 100 accouchements) 1999-2001 15

42. Indice synthétique de grossesse (grossesses par femme) 1997-1998 15

Naissances vivantes

43. Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004 15

44. Naissances de faible poids (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004 15

45. Naissances prématurées (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2000-2004 16

46. Répartition des naissances selon la scolarité de la mère (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004 16

SERVICES DE SANTÉ**Services préventifs**47.0 Dépenses *per capita* en services de santé (\$) 2002-2003 16

47. Taux de participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans (%) 2001 16

48. Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie (%) 1999-2000 16

49. Femmes de 15 ans et plus ayant subi un test de PAP (%) 1998 16

50. Personnes de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe (%)
Qc : 2001-2002; SLSJ : 2002-2003 16**Services de première ligne**

51. Population ayant consommé trois médicaments différents et plus (%) 1998 16

52. Population de 15 ans et plus qui a utilisé Info-Santé CLSC (%) 1998 16

53. Personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins
aux personnes âgées (%) 2001 16

54. Nombre de médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale par 100 000 habitants 17

55. Taux de participation de la population en médecine et chirurgie (%) 2001 17

Services hospitaliers

56. Pourcentage de séjours excessifs à l'urgence (%) 2001-2002 17

57. Taux d'hospitalisations jugées évitables (p. 10 000) 1996-2001 17

58. Durée moyenne de séjour en soins physiques de courte durée (journées d'hospitalisation)
1999-2001 18

59. Taux d'interventions dites pertinentes (p. 10 000) 1998-2001 18

60. Taux de mortalité évitable (p. 100 000) 1994-1998 19

61. Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (%) 2000-2001 19

62. Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (%) 2000-2001 19

63. Taux d'admission dans un CHSLD (pour 100 lits) Qc : 1999; SLSJ : 2002 19

64. Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un CHSLD (en jours) Qc : 1999; SLSJ : 2002 ... 19

65. Population de 65 ans et plus en institution de santé (%) 1996 19

ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL

66. Population de 18 ans et plus percevant son état de santé comme médiocre (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000 20

67. Espérance de vie à la naissance (en années) 1995-1999 20

68. Espérance de vie en bonne santé - sans limitations d'activités (en années) Qc : 1998; SLSJ : 2000 20

69. Taux de mortalité selon l'âge (p. 100 000) 1998-2002 20

70. Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 1995-1999 20

71. Mortalité périnatale (pour 1 000 naissances totales) 1995-1999 21

ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE**Limitations d'activités**

72. Population ayant une limitation d'activités à long terme (%) 1998 21

Prévalence et incidence des problèmes73. Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MADO) (p. 100 000)
Qc : 1995-1999; SLSJ : 1997-2001 21

74. a. Prévalence des principaux problèmes de santé (%) 1998 22

b. Prévalence du diabète ajustée selon l'âge (%) 2001-2002 22

Morbidité selon la cause

75. Taux ajusté d'hospitalisation selon le diagnostic principal (p. 100 000) 1998-2001 22

76. Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels (p. 10 000) 1998-2001 22

77. Taux ajusté d'incidence des cancers (p. 100 000) 1997-2001 23

Mortalité selon la cause

78. Taux ajusté de mortalité selon la cause (p. 100 000) 1994-1998 23

79. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (p. 100 000) 1994-1998 23

80. Taux ajusté de mortalité par cancers (p. 100 000) 1994-1998 23

81. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (p. 100 000) 1994-1998 24

82. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels (p. 100 000) 1994-1998 24

83. Taux ajusté de mortalité par suicide (p. 100 000) 1994-1998 24

84. Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (p. 100 000) 1994-1998 24

Santé dentaire85. Indice de surfaces de dents permanentes cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 2^e et 6^e année (%) 1998-1999 24**ÉTAT DE SANTÉ MENTALE**86. Population de 18 ans et plus dont la détresse psychologique dépasse le seuil symptomatologique (%)
Qc : 1998; SLSJ : 2000 24

87. Population de 18 ans et plus présentant des idées suicidaires sérieuses et récentes (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000 24

ANNEXE - FICHES MÉTHODOLOGIQUES 25**BIBLIOGRAPHIE 40**

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

CCADTC	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux
CH	Centre hospitalier
CHSLD	Centre d'hébergement et de soins de longue durée
CIM-9	Classification internationale des maladies, 9 ^e révision
CIM-10	Classification internationale des maladies, 10 ^e révision
CLSC	Centre local de services communautaires
CSSS	Centre de santé et de services sociaux
DCS	Direction de la coordination des services
DGI	Direction générale de l'information (MSSS)
DRHC	Direction des ressources humaines Canada
DSP-02	Direction de santé publique
ESCC	Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
ESQ	Enquête de santé Québec
ESS	Enquête sociale et de santé
ESUTC	Enquête de surveillance sur l'usage du tabac au Canada
GRIS	Groupe de recherche interdisciplinaire en santé
INSPQ	Institut national de santé publique du Québec
ISQ	Institut de la statistique du Québec
LSP	Loi sur la santé publique
MENV	Ministère de l'Environnement
MESSF	Ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille
MSP	Ministère de la Sécurité publique
MSSS	Ministère de la Santé et des Services sociaux
MVC	Maladies vasculaires cérébrales
RAMQ	Régie de l'assurance-maladie du Québec
RLS	Réseaux locaux de services
SLSJ	Région Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 02)

INTRODUCTION

Le *Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires* a été conçu d'abord comme un outil de référence à un ensemble de données pouvant être utiles à la planification des activités et services en santé publique. Il contient un ensemble de repères permettant de connaître rapidement la situation à un moment donné dans le temps. À ce titre, il a permis de soutenir la démarche d'élaboration des plans d'action de santé publique, soit le plan d'action régional (PAR) et les plans d'action locaux (PAL) prescrits dans la Loi sur la santé publique (LSP). Il a été utilisé notamment pour la production des portraits de santé des clientèles que l'on retrouve dans le PAR et dans les PAL.

Le présent document contient les résultats de 87 indicateurs sociosanitaires ou groupes d'indicateurs relatifs à l'ensemble du Québec, à la population de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ ou région 02) et aux populations locales desservies par les six centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région. Compte tenu du nombre élevé d'indicateurs présentés, ceux-ci ne font l'objet d'aucune analyse.

Le document a été conçu pour faciliter les comparaisons entre les territoires. Le lecteur intéressé aux informations d'ordre méthodologique spécifiques à chacun des indicateurs (définition, sources et notes) pourra se référer aux fiches méthodologiques présentées en ordre numérique à l'annexe. Des précisions d'ordre plus général concernant la méthodologie sont également présentées à la section suivante.

Mise à jour août 2005

Depuis la production et la diffusion de la première version du tableau synoptique (octobre 2003), des données plus récentes ont été produites et rendues disponibles par différents organismes ou ministères provinciaux ou fédéraux. Cette version mise à jour du tableau synoptique inclut donc ces informations récentes pour plus d'une quinzaine d'indicateurs. Les données apparaissent alors en caractères gras ce qui permet d'identifier rapidement les indicateurs mis à jour.

Par rapport à la version d'octobre 2003, la liste des indicateurs inclus au tableau synoptique a été légèrement modifiée : l'indicateur 11b (Indice de dépendance économique) a été retiré parce que l'information était redondante avec celle fournie par l'indicateur 11a. L'indicateur 12 (population vivant sous le seuil de faible revenu) a été modifié : la proportion de la population vivant à moins de 50 % du seuil de faible revenu a été ajoutée (indicateur 12b) et l'information est présentée pour les hommes et les femmes. L'indicateur 7 a aussi été mis à jour et modifié : il concerne maintenant la langue maternelle plutôt que la langue parlée à la maison. L'indicateur 29 (taux de perpétration d'actes de violence conjugale par les hommes de 12 ans et plus) a été remplacé par le taux de victimisation pour violence conjugale chez les hommes de 12 ans et plus. Par ailleurs, trois indicateurs ont été ajoutés : 9b (population de 20 ans et plus détenant un diplôme universitaire), 47.0 (dépenses per capita en services de santé) et 74b (prévalence du diabète ajustée selon l'âge). L'indicateur 22 (enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent) a été mis à jour et modifié en y ajoutant trois catégories d'âges (0-5 ans, 6-14 ans, 15-17 ans).

La structure par âge de la population (indicateur 1) est celle estimée en 2004, selon les dernières perspectives démographiques produites par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Enfin, pour les indicateurs relatifs à la mortalité (indicateurs 78 à 84), en raison du passage à la 10^e version de la Classification Internationale des maladies (CIM-10) adoptée à partir de 2000, les données ne seront mises à jour que dans une version ultérieure.

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Comme il a été mentionné précédemment, on retrouve dans les fiches méthodologiques en annexe des informations spécifiques à chacun des indicateurs. En complément à celles-ci, la section qui suit porte sur des aspects plus généraux de la méthodologie.

• Les critères de sélection des indicateurs sociosanitaires

Le choix des indicateurs est le fruit d'un consensus d'experts en santé publique du MSSS, de l'INSPQ et des directions régionales de santé publique. Différentes politiques de santé québécoises et canadiennes ainsi que de multiples travaux sur les indicateurs sociosanitaires réalisés tant au plan national qu'international ont été considérés. Plusieurs critères ont servi à sélectionner ces indicateurs (INSPQ, 2001 : 5), il convient de les rappeler.

1. *Les indicateurs doivent être utiles à la prise de décision dans les domaines de la planification et de la programmation en santé publique.*
2. *Les indicateurs doivent être sensibles sur des intervalles de temps relativement courts. Les valeurs doivent fluctuer en fonction des variations de l'objet qu'ils tentent de mesurer.*
3. *Les indicateurs doivent permettre des comparaisons dans le temps. Les mesures doivent donc être répétées à plusieurs moments.*
4. *La valeur des indicateurs doit présenter une certaine variabilité dans le temps et dans l'espace. Si les valeurs varient peu, l'indicateur risque d'être peu informatif.*
5. *Les indicateurs doivent être d'ores et déjà disponibles. Les données nécessaires au calcul doivent donc être elles-mêmes disponibles.*
6. *Les indicateurs doivent être disponibles à l'échelle des régions.*
7. *Les indicateurs doivent présenter un caractère d'exclusivité mutuelle. Pris dans leur ensemble, ils ne doivent pas présenter de duplication entre eux.*
8. *Les indicateurs doivent bénéficier d'une certaine notoriété, ce qui leur confère une validité a priori.*
9. *Les indicateurs doivent offrir un important potentiel informationnel même si dans certains cas ils sont peu connus, peu utilisés ou nouveaux.*

Les indicateurs du tableau synoptique sont en continuité avec le *Portrait de santé Le Québec et ses régions* (INSPQ, 2001). La numérotation et, parfois la définition, étant différentes, un lien est fait dans la fiche méthodologique. Ainsi, il est possible de compléter les informations et/ou d'obtenir des données complémentaires à l'indicateur.

Le choix des indicateurs tient compte également de la révision effectuée dans le cadre de l'élaboration du Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants 2004-2007, commun à l'ensemble des directions de santé publique, prescrit dans la Loi sur la santé publique. La présentation, notamment, reproduit l'univers de la surveillance (classe d'objets, composantes, sous-composantes et objets) ayant fait l'objet d'un consensus provincial.

• Les six territoires sociosanitaires

Les territoires sociosanitaires correspondent aux territoires desservis par les CSSS. Il s'agit de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-Jean-Est.

Compte tenu des ententes de services entre les établissements desservant les territoires Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-Jean-Est, la municipalité de St-Ludger-de-Milot, dans la mesure du possible, a été incluse dans le territoire Maria-Chapdelaine. Le cas échéant, la note apparaît dans la fiche méthodologique. Cette municipalité étant de faible taille – Statistique Canada y a recensé 764 habitants en 2001 – l'impact sur les mesures est négligeable.

• La disponibilité des indicateurs au niveau local

Bien que certains indicateurs ne soient pas disponibles à l'échelle des territoires sociosanitaires, il arrive que des données soient tout de même indiquées. Ainsi, lorsque les données sont issues d'enquêtes nationales représentatives à l'échelle des régions seulement, la donnée fournie par territoire est le nombre annuel moyen d'effectifs pouvant être concernés. Ce nombre a été estimé en appliquant la valeur de l'indicateur de la région à la population du territoire pour l'année concernée. Par ailleurs, lorsque les données sont disponibles à l'échelle des MRC, les trois territoires de la sous-région du Saguenay se sont vu attribuer la valeur observée dans la MRC du Fjord (ou encore MRC du Fjord et la ville de Saguenay). Le problème ne se pose pas pour les trois autres territoires sociosanitaires de la sous-région du Lac-Saint-Jean, qui correspondent chacun intégralement à la MRC de même nom.

• Les tests statistiques

Les résultats des tests servent à apprécier l'écart entre la valeur observée dans un territoire donné (région, CSSS) et celle d'un territoire de référence (le Québec ou la région). Les symboles, + ou -, notés entre parenthèses ou entre accolades, indiquent des différences significatives au seuil $P \leq 0,05$. L'indicateur est, soit significativement plus élevé (+), soit significativement moins élevé (-). Si la différence est non significative (**n.s.**) au seuil retenu, l'abréviation est mentionnée. L'utilisation de la parenthèse (+) (-) (**n.s.**) signifie que le territoire de référence est le Québec alors que les accolades {+} {-} {**n.s.**} indiquent une comparaison entre un territoire de CSSS et la région.

Les tests statistiques n'étant pas toujours pertinents pour chaque indicateur, la mention **s.o.** pour *sans objet* est inscrite dans la colonne **Test** lorsque c'est le cas.

• Les prévisions

Les données disponibles nécessaires au calcul des indicateurs sont rarement récentes. Pour contrer cette lacune, dans la mesure du possible, nous avons donné un aperçu de l'évolution prévisible sur une courte période (2005-2006) de la valeur de l'indicateur régional. Les prévisions, qui ne concernent qu'un nombre limité d'indicateurs, sont formulées en termes généraux, soit une augmentation (↗), une stabilité (↔) ou une diminution (↘). La méthode utilisée varie selon les types d'indicateurs.

En bref, pour les effectifs de population, les projections reflètent celles de l'ISQ (MSSS, 2001); pour les habitudes de vie, les facteurs de risque et certains comportements préventifs – mesurés à partir de données tirées d'enquêtes – les analyses prospectives ont varié d'un modèle simple (basé sur quelques données chronologiques disponibles associées à une analyse qualitative), à un modèle mathématique complexe (basé sur une série chronologique, des modèles de projection et des analyses d'interaction avec divers facteurs d'influence intégrés dans une équation de régression logistique). Enfin, les prévisions relatives spécifiquement aux taux de mortalité et d'incidence découlent d'analyses combinées de séries chronologiques et de projections linéaires ou logarithmiques.

• Les totalisations des territoires sociosanitaires

Les effectifs réels ou estimés pour la région SLSJ ne correspondent pas toujours à la somme des effectifs des territoires sociosanitaires, principalement pour deux raisons. D'abord, lorsque les données proviennent des recensements canadiens, les différences sont attribuables à l'*arrondissement aléatoire* des chiffres appliqué par Statistique Canada pour assurer le caractère confidentiel des renseignements fournis. En bref, tous les chiffres d'une totalisation, y compris les totaux, sont arrondis de façon aléatoire jusqu'à un multiple de 5, dans certains cas de 10 (Statistique Canada, 2001 : annexe B). Par ailleurs, dans le cas des données tirées d'une enquête régionale, l'écart s'explique par l'utilisation de facteurs de pondération différents selon l'échelle territoriale utilisée.

• Les principales sources de données

Pour la très grande majorité des indicateurs, la compilation et le traitement des données ont été effectués par le Service recherche, connaissance, surveillance de la Direction de santé publique. Les données utilisées proviennent de diverses sources dont la référence est mentionnée dans les fiches méthodologiques, les principales étant:

- pour les effectifs de population utilisés comme dénominateurs : les fichiers de l'ISQ contenant les perspectives démographiques, selon le territoire sociosanitaire et de Réseaux locaux de services (RLS) pour la période 2001-2026 (édition 2003, mise à jour de janvier 2005);
- pour les *Conditions démographiques, socioculturelles et socio-économiques* : les fichiers tirés des recensements produits par Statistique Canada, les perspectives démographiques produites par l'ISQ, ainsi que les tableaux géocodés produits conjointement par le MSSS et Statistique Canada;
- pour l'*Environnement social et l'Adaptation sociale*, les *Habitudes de vie*, *Facteurs de risques et Comportements préventifs* : les enquêtes nationales de santé (enquêtes générales de Santé Québec, enquêtes sur la santé des collectivités canadiennes), l'enquête psychosociale régionale réalisée en 2000, ainsi que les fichiers des naissances et des mortinaissances provenant du MSSS;
- pour les *Services de santé* : les fichiers des hospitalisations (MED-ÉCHO);
- pour l'*État de santé global* : les fichiers des décès et le Registre des tumeurs du Québec.

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est											
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an										
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D									
CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES																																
Structure par âge																																
1. Population selon l'âge (%) 2004																																
Total, (n)					277 049					23 579					77 158					65 383				32 655				26 623				51 651
0 - 5 ans (%), (n)	5,9	5,3	s.o.	↘	14 672	5,0	s.o.	1 179	5,1	s.o.	3 921	5,1	s.o.	3 357	5,8	s.o.	1 889	5,8	s.o.	1 531	5,4	s.o.	2 795									
6-17 ans (%), (n)	14,6	14,8	s.o.	↘	40 885	15,9	s.o.	3 746	14,4	s.o.	11 148	14,2	s.o.	9 275	14,8	s.o.	4 819	15,4	s.o.	4 091	15,1	s.o.	7 806									
18 - 64 ans (%), (n)	65,9	66,3	s.o.	↘	183 703	66,5	s.o.	15 670	67,0	s.o.	51 708	66,9	s.o.	43 729	65,9	s.o.	21 529	65,1	s.o.	17 333	65,3	s.o.	33 734									
65 ans et plus (%), (n)	13,6	13,6	s.o.	↔	37 789	12,7	s.o.	2 984	13,5	s.o.	10 381	13,8	s.o.	9 022	13,5	s.o.	4 418	13,8	s.o.	3 668	14,2	s.o.	7 316									
0 - 5 ans	5,9	5,3	s.o.	↘	14 672	5,0	s.o.	1 179	5,1	s.o.	3 921	5,1	s.o.	3 357	5,8	s.o.	1 889	5,8	s.o.	1 531	5,4	s.o.	2 795									
6 - 11 ans	7,1	6,8	s.o.	↘	18 701	7,2	s.o.	1 690	6,6	s.o.	5 116	6,6	s.o.	4 292	6,9	s.o.	2 238	6,9	s.o.	1 827	6,8	s.o.	3 538									
12 - 17 ans	7,6	8,0	s.o.	↘	22 184	8,7	s.o.	2 056	7,8	s.o.	6 032	7,6	s.o.	4 983	7,9	s.o.	2 581	8,5	s.o.	2 264	8,3	s.o.	4 268									
18 - 24 ans	9,2	10,1	s.o.	↘	27 986	9,5	s.o.	2 235	10,0	s.o.	7 733	9,8	s.o.	6 424	10,6	s.o.	3 455	10,5	s.o.	2 783	10,4	s.o.	5 356									
25 - 44 ans	29,2	26,4	s.o.	↘	73 247	28,0	s.o.	6 607	26,7	s.o.	20 636	26,3	s.o.	17 201	25,7	s.o.	8 394	25,8	s.o.	6 858	26,2	s.o.	13 551									
45 - 64 ans	27,5	29,8	s.o.	↗	82 470	29,0	s.o.	6 828	30,2	s.o.	23 339	30,7	s.o.	20 104	29,6	s.o.	9 680	28,9	s.o.	7 692	28,7	s.o.	14 827									
65 - 74 ans	7,5	7,9	s.o.	↗	21 957	7,6	s.o.	1 793	7,8	s.o.	5 988	8,0	s.o.	5 202	8,0	s.o.	2 610	7,8	s.o.	2 070	8,3	s.o.	4 294									
75 - 84 ans	4,7	4,6	s.o.	↗	12 751	4,1	s.o.	968	4,6	s.o.	3 535	4,8	s.o.	3 126	4,4	s.o.	1 433	4,7	s.o.	1 259	4,7	s.o.	2 430									
85 ans et plus	1,4	1,1	s.o.	↗	3 081	0,9	s.o.	223	1,1	s.o.	858	1,1	s.o.	694	1,1	s.o.	375	1,3	s.o.	339	1,1	s.o.	592									
0-14 ans (%), (n)	16,9	16,1	s.o.	↘	44 710	16,8	s.o.	3 966	15,7	s.o.	12 131	15,6	s.o.	10 208	16,6	s.o.	5 417	16,9	s.o.	4 487	16,5	s.o.	8 501									
15-64 ans (%), (n)	69,5	70,2	s.o.	↘	194 550	70,5	s.o.	16 629	70,8	s.o.	54 646	70,6	s.o.	46 153	69,9	s.o.	22 820	69,4	s.o.	18 468	69,4	s.o.	35 834									
65 ans et plus (%), (n)	13,6	13,6	s.o.	↔	37 789	12,7	s.o.	2 984	13,5	s.o.	10 381	13,8	s.o.	9 022	13,5	s.o.	4 418	13,8	s.o.	3 668	14,2	s.o.	7 316									
Âge médian (en années) 2004	38,9	40,4	s.o.	↗	—	40,0	s.o.	—	40,4	s.o.	—	41,0	s.o.	—	40,2	s.o.	—	40,0	s.o.	—	40,2	s.o.	—									
Indice de dépendance total (%) 2004	43,9	42,4	s.o.	↔	—	41,8	s.o.	—	41,2	s.o.	—	41,7	s.o.	—	43,1	s.o.	—	44,2	s.o.	—	44,1	s.o.	—									
Indice de dépendance des jeunes (%) 2004	24,4	23,0	s.o.	↘	—	23,8	s.o.	—	22,2	s.o.	—	22,1	s.o.	—	23,7	s.o.	—	24,3	s.o.	—	23,7	s.o.	—									
Indice de dépendance des aînés (%) 2004	19,5	19,4	s.o.	↗	—	17,9	s.o.	—	19,0	s.o.	—	19,5	s.o.	—	19,4	s.o.	—	19,9	s.o.	—	20,4	s.o.	—									
Indice de vieillesse (%) 2004	80,2	84,5	s.o.	↗	—	75,2	s.o.	—	85,6	s.o.	—	88,4	s.o.	—	81,6	s.o.	—	81,7	s.o.	—	86,1	s.o.	—									
Rapport de masculinité (%) 2004	97,4	99,5	s.o.	↔	—	104,6	s.o.	—	98,9	s.o.	—	99,2	s.o.	—	100,8	s.o.	—	103,1	s.o.	—	101,2	s.o.	—									
Mouvement de la population																																
2. Taux d'accroissement de la population (%) 1996 à 2001																																
Total	1,4	-3,0	s.o.	↘	-1 677	-5,1	s.o.	-251	-3,7	s.o.	-579	2,2	s.o.	-294	-3,4	s.o.	-225	-3,8	s.o.	-210	-1,1	s.o.	-118									
0 - 14 ans	-6,1	-18,3	s.o.	↘	-1 961	-22,2	s.o.	-220	-17,5	s.o.	-505	-15,9	s.o.	-378	-20,7	s.o.	-275	-20,4	s.o.	-224	-17,6	s.o.	-359									
15 - 64 ans	1,6	-1,9	s.o.	↔	-731	-3,5	s.o.	-119	-3,1	s.o.	-347	-1,4	s.o.	-134	-1,3	s.o.	-58	-2,2	s.o.	-83	0,1	s.o.	10									
65 ans et plus	10,9	15,5	s.o.	↗	1 015	16,1	s.o.	88	15,3	s.o.	273	13,4	s.o.	218	14,6	s.o.	108	15,5	s.o.	97	19,0	s.o.	231									
3. Indice synthétique de fécondité (enfants par femme)																																
Qc : 1997-1999; SLSJ : 1999-2001	1,43	1,40	s.o.	—	—	1,37	s.o.	—	1,37	s.o.	—	1,35	s.o.	—	1,55	s.o.	—	1,51	s.o.	—	1,39	s.o.	—									

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs socio-sanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires socio-sanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
CONDITIONS SOCIOCULTURELLES																							
Modalités de vie																							
<i>4. Population de 15 ans et plus vivant seule (%) 2001</i>																							
Sexes réunis	15,2	12,0	s.o.		26 905	10,9	s.o.	2 080	13,0	s.o.	8 130	12,8	s.o.	6 890	11,3	s.o.	2 950	11,2	s.o.	2 400	10,7	s.o.	4 450
Hommes	13,9	11,0	s.o.		12 195	10,2	s.o.	975	11,2	s.o.	3 435	11,4	s.o.	3 010	10,5	s.o.	1 355	11,4	s.o.	1 230	10,5	s.o.	2 190
Femmes	16,4	13,0	s.o.		14 720	11,6	s.o.	1 105	14,8	s.o.	4 690	14,1	s.o.	3 890	12,3	s.o.	1 600	11,1	s.o.	1 170	10,9	s.o.	2 260
<i>5. Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (%) 2001</i>																							
	90,1	89,6	s.o.		31 545	91,9	s.o.	2 675	88,6	s.o.	8 545	93,4	s.o.	8 105	84,9	s.o.	3 385	86,0	s.o.	2 885	89,4	s.o.	5 935
<i>6. Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait (%) 2001</i>																							
Actuellement mariés	40,3	43,7	s.o.		100 305	47,3	s.o.	9 205	42,3	s.o.	27 045	43,2	s.o.	23 615	42,7	s.o.	11 470	45,1	s.o.	9 905	44,9	s.o.	19 065
Partenaires en union libre	17,0	16,7	s.o.		38 370	16,1	s.o.	3 135	16,9	s.o.	10 815	16,7	s.o.	9 145	17,4	s.o.	4 690	16,2	s.o.	3 550	16,6	s.o.	7 045
Autres : célibataires, séparés, divorcés et veufs	42,7	39,6	s.o.		90 860	36,6	s.o.	7 125	40,9	s.o.	26 160	40,1	s.o.	21 970	39,9	s.o.	10 725	38,8	s.o.	8 515	38,5	s.o.	16 345
Langues																							
<i>7. Population selon la langue maternelle (%) 2001</i>																							
Français	80,9	98,6	s.o.		271 380	98,4	s.o.	23 395	98,6	s.o.	75 410	98,3	s.o.	64 090	98,0	s.o.	31 565	99,5	s.o.	26 310	99,1	s.o.	50 610
Anglais	8,7	0,8	s.o.		2 315	1,4	s.o.	335	0,8	s.o.	630	1,2	s.o.	780	0,5	s.o.	145	0,3	s.o.	85	0,6	s.o.	325
Autres	10,5	0,5	s.o.		1 485	0,2	s.o.	50	0,6	s.o.	450	0,5	s.o.	335	1,5	s.o.	490	0,1	s.o.	35	0,2	s.o.	125
Immigration																							
<i>8. Immigrants (%) 2001</i>																							
	9,9	0,7	s.o.		2 040	0,8	s.o.	180	1,0	s.o.	765	0,7	s.o.	470	0,5	s.o.	155	0,5	s.o.	130	0,7	s.o.	340
CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES																							
Scolarité																							
<i>9. a. Population de 20 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur au certificat d'études secondaires (%) 2001</i>																							
Total	23,5	23,9	s.o.	↘	40 880	28,2	s.o.	4 145	19,2	s.o.	9 240	19,8	s.o.	8 145	29,9	s.o.	5 945	33,9	s.o.	5 490	25,2	s.o.	7 920
20 - 34 ans	16,0	15,8	s.o.	↘	7 755	21,3	s.o.	860	14,0	s.o.	1 980	11,9	s.o.	1 370	17,5	s.o.	990	18,5	s.o.	855	18,8	s.o.	1 695
35 - 44 ans	20,7	21,7	s.o.	↘	10 495	23,6	s.o.	1 100	17,2	s.o.	2 240	16,8	s.o.	1 910	28,1	s.o.	1 575	32,5	s.o.	1 515	23,6	s.o.	2 135
45 - 64 ans	31,1	30,6	s.o.	↘	22 630	36,4	s.o.	2 185	23,9	s.o.	5 020	26,8	s.o.	4 865	39,3	s.o.	3 380	45,2	s.o.	3 120	30,8	s.o.	4 090
<i>b. Population de 20 ans et plus ayant un diplôme universitaire (%) 2001</i>																							
	13,9	9,2	s.o.		20 575	7,0	s.o.	1 345	12,9	s.o.	8 040	8,5	s.o.	4 560	7,1	s.o.	1 855	6,2	s.o.	1 330	8,3	s.o.	3 445
Revenu																							
<i>10. Revenu personnel par habitant (moyenne en dollars courants) 2003</i>																							
Revenu personnel	27 507	24 485	s.o.	↗	—	25 081	s.o.	—	25 081	s.o.	—	25 081	s.o.	—	24 110	s.o.	—	22 481	s.o.	—	23 824	s.o.	—
Revenu personnel disponible	20 937	18 576	s.o.	↗	—	18 823	s.o.	—	18 823	s.o.	—	18 823	s.o.	—	18 712	s.o.	—	17 600	s.o.	—	18 194	s.o.	—

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇌; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES (SUITE)																							
<i>11. Rapport de dépendance économique (\$ par 100\$ de revenu d'emploi) 2002</i>																							
Sexes réunis	19,4	24,2	s.o.	—	—	22,5	s.o.	—	22,5	s.o.	—	22,5	s.o.	—	26,5	s.o.	—	30,3	s.o.	—	26,8	s.o.	—
Hommes	13,6	17,5	s.o.	—	—	15,8	s.o.	—	15,8	s.o.	—	15,8	s.o.	—	19,9	s.o.	—	22,7	s.o.	—	20,2	s.o.	—
Femmes	29,2	39,6	s.o.	—	—	37,9	s.o.	—	37,9	s.o.	—	37,9	s.o.	—	40,8	s.o.	—	50,6	s.o.	—	42,2	s.o.	—
<i>12. Population vivant sous le seuil de faible revenu (%) 2001</i>																							
<i>a. Sous le seuil</i>																							
Sexes réunis	19,1	15,6	s.o.	42 170	15,6	s.o.	3 680	15,9	s.o.	11 995	17,2	s.o.	11 110	12,9	s.o.	3 885	14,8	s.o.	3 875	15,0	s.o.	7 620	
Hommes	17,3	13,5	s.o.	18 190	13,9	s.o.	1 660	13,8	s.o.	5 160	14,5	s.o.	4 620	11,4	s.o.	1 715	12,8	s.o.	1 695	13,0	s.o.	3 330	
Femmes	20,8	17,6	s.o.	23 980	17,3	s.o.	2 020	17,9	s.o.	6 830	19,8	s.o.	6 490	14,5	s.o.	2 170	16,8	s.o.	2 180	17,0	s.o.	4 290	
<i>b. À moins de 50 % du seuil</i>																							
Sexes réunis	7,0	5,9	s.o.	16 020	6,8	s.o.	1 605	6,2	s.o.	4 680	6,3	s.o.	4 055	4,8	s.o.	1 435	4,9	s.o.	1 275	5,8	s.o.	2 965	
Hommes	6,9	5,6	s.o.	7 580	6,3	s.o.	750	5,9	s.o.	2 195	5,6	s.o.	1 780	4,5	s.o.	675	5,0	s.o.	670	5,9	s.o.	1 510	
Femmes	7,0	6,2	s.o.	8 440	7,3	s.o.	855	6,5	s.o.	2 485	7,0	s.o.	2 275	5,1	s.o.	760	4,7	s.o.	605	5,8	s.o.	1 455	
<i>13. Adultes de 18 à 64 ans prestataires du programme d'assistance-emploi (%) 2004</i>																							
<i>18 - 64 ans</i>																							
18 - 24 ans	8,0	8,8	s.o.	16 095	8,0	s.o.	1 244	9,1	s.o.	4 689	10,4	s.o.	4 567	8,3	s.o.	1 795	7,7	s.o.	1 338	8,4	s.o.	2 829	
25 - 34 ans	6,0	7,2	s.o.	2 012	6,1	s.o.	133	7,5	s.o.	571	9,1	s.o.	600	5,3	s.o.	183	6,4	s.o.	177	6,5	s.o.	350	
35 - 44 ans	7,5	8,8	s.o.	2 725	8,1	s.o.	215	9,3	s.o.	844	11,3	s.o.	817	7,1	s.o.	249	6,4	s.o.	182	7,9	s.o.	446	
45 - 54 ans	8,0	8,5	s.o.	3 599	7,1	s.o.	290	8,9	s.o.	1 023	10,4	s.o.	1 034	8,8	s.o.	430	7,2	s.o.	288	7,8	s.o.	617	
55 - 64 ans	8,2	8,7	s.o.	4 213	8,4	s.o.	333	8,8	s.o.	1 222	10,2	s.o.	1 198	8,3	s.o.	472	7,5	s.o.	342	8,8	s.o.	772	
10 ans et plus	10,0	10,5	s.o.	3 546	10,1	s.o.	273	10,7	s.o.	1 029	11,0	s.o.	918	11,5	s.o.	461	11,1	s.o.	349	10,7	s.o.	644	
<i>14. Répartition des adultes prestataires du programme d'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (%) 2004</i>																							
Moins de 2 ans	14,6	11,6	s.o.	1 861	8,5	s.o.	106	11,4	s.o.	533	12,1	s.o.	552	10,6	s.o.	190	11,9	s.o.	160	11,1	s.o.	313	
2 - 3 ans	10,0	8,3	s.o.	1 331	8,2	s.o.	102	8,6	s.o.	402	8,7	s.o.	397	6,7	s.o.	121	8,9	s.o.	119	7,1	s.o.	200	
4 - 9 ans	24,1	21,7	s.o.	3 501	21,4	s.o.	266	21,7	s.o.	1 018	21,3	s.o.	971	21,0	s.o.	378	22,3	s.o.	299	21,1	s.o.	596	
10 ans et plus	51,3	58,4	s.o.	9 408	61,9	s.o.	771	58,3	s.o.	2 736	58,0	s.o.	2 648	61,7	s.o.	1 108	56,8	s.o.	761	60,8	s.o.	1 721	
<i>15. Personnes de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (%) 1999</i>																							
Sexes réunis	50,1	54,2	s.o.	19 084	n.d.	1 588	n.d.	5 222	n.d.	4 710	n.d.	2 168	n.d.	1 859	n.d.	3 547							
Hommes	43,2	46,4	s.o.	6 932	n.d.	589	n.d.	1 791	n.d.	1 675	n.d.	810	n.d.	712	n.d.	1 343							
Femmes	55,0	60,0	s.o.	12 171	n.d.	972	n.d.	3 486	n.d.	3 033	n.d.	1 344	n.d.	1 143	n.d.	2 190							

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇌; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires

	Québec		Saguenay-Lac-St-Jean			La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est			
	Indic		Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A		A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES (SUITE)																								
Emploi																								
16. Taux d'emploi (%) 2001	58,9		50,8	s.o.		116 652	50,1	s.o.	9 743	52,9	s.o.	33 844	49,7	s.o.	27 213	51,2	s.o.	13 763	48,0	s.o.	10 548	50,8	s.o.	21 570
17. Taux de chômage (%) 2001	8,2		13,7	s.o.		18 485	14,2	s.o.	1 611	12,3	s.o.	4 750	13,2	s.o.	4 135	14,7	s.o.	2 371	16,3	s.o.	2 056	14,2	s.o.	3 569
18. Population active expérimentée selon le secteur d'activité (%) 2001																								
Secteur primaire	3,9		7,0	s.o.		8 945	5,7	s.o.	605	4,3	s.o.	1 555	4,0	s.o.	1 175	9,2	s.o.	1 390	17,7	s.o.	2 110	8,9	s.o.	2 115
Secteur manufacturier et de la construction	22,2		23,1	s.o.		29 470	24,9	s.o.	2 665	19,4	s.o.	7 100	26,0	s.o.	7 640	22,5	s.o.	3 410	22,6	s.o.	2 695	25,0	s.o.	5 965
Secteur tertiaire	73,9		69,9	s.o.		89 140	69,4	s.o.	7 425	76,3	s.o.	27 855	70,1	s.o.	20 620	68,4	s.o.	10 375	59,7	s.o.	7 110	66,1	s.o.	15 760
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE																								
Qualité de l'eau																								
19. Population selon la source d'approvisionnement en eau potable (%) Qc : 1999; SLSJ : 2001																								
Eau de surface	68,1		76,4	s.o.		217 723	5,0	s.o.	1 211	92,6	s.o.	73 423	91,3	s.o.	61 482	51,7	s.o.	17 271	73,5	s.o.	20 146	83,2	s.o.	44 190
Eau souterraine	31,9		23,6	s.o.		67 228	95,0	s.o.	23 204	7,4	s.o.	5 853	8,7	s.o.	5 863	48,3	s.o.	16 122	26,5	s.o.	7 256	16,8	s.o.	8 930
ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADAPTATION SOCIALE																								
Soutien social																								
20. Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale (%) 1998																								
Sexes réunis	13,1		10,4	(-) ↗		23 871	n.d.		2 029	n.d.		6 658	n.d.		5 690	n.d.		2 797	n.d.		2 350	n.d.		4 349
Hommes	12,8		9,5	s.o.		10 752	n.d.		928	n.d.		2 960	n.d.		2 531	n.d.		1 270	n.d.		1 080	n.d.		1 981
Femmes	13,3		11,2	s.o.		13 033	n.d.		1 089	n.d.		3 685	n.d.		3 140	n.d.		1 514	n.d.		1 255	n.d.		2 349
Réalités familiales																								
21. Familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille (%) 2001																								
Total	100,0		100,0	s.o.		35 570	100,0	s.o.	3 195	100,0	s.o.	9 510	100,0	s.o.	8 060	100,0	s.o.	4 470	100,0	s.o.	3 555	100,0	s.o.	6 765
Couples mariées	50,5		54,1	s.o.		19 265	58,5	s.o.	1 870	54,1	s.o.	5 140	51,8	s.o.	4 175	53,4	s.o.	2 385	56,7	s.o.	2 015	54,3	s.o.	3 675
Couples vivant en union libre	26,8		27,6	s.o.		9 825	26,3	s.o.	840	26,7	s.o.	2 540	27,5	s.o.	2 220	29,7	s.o.	1 330	27,3	s.o.	970	28,3	s.o.	1 915
Familles monoparentales	22,7		18,2	s.o.		6 480	15,2	s.o.	485	19,2	s.o.	1 830	20,7	s.o.	1 665	16,9	s.o.	755	16,0	s.o.	570	17,4	s.o.	1 175
22. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent selon l'âge (%) 2001																								
Total	19,7		15,6	s.o.		9 445	13,0	s.o.	695	16,8	s.o.	2 765	17,9	s.o.	2 395	14,5	s.o.	1 085	13,5	s.o.	850	14,1	s.o.	1 660
0-5 ans	15,4		12,4	s.o.		2 005	9,6	s.o.	130	13,0	s.o.	575	16,0	s.o.	590	13,2	s.o.	270	9,5	s.o.	155	9,3	s.o.	280
6-14 ans	21,0		16,5	s.o.		5 310	14,8	s.o.	455	18,3	s.o.	1 600	17,7	s.o.	1 260	16,1	s.o.	615	12,9	s.o.	425	15,2	s.o.	955
15-17 ans	23,4		17,4	s.o.		2 130	11,9	s.o.	110	17,8	s.o.	585	21,0	s.o.	545	12,2	s.o.	195	19,9	s.o.	270	17,3	s.o.	425
Adaptation sociale																								
23. Taux de grossesse à l'adolescence (p. 1 000) 1997-1998																								
Total, moins de 20 ans	36,3		31,1	s.o.		452	n.d.		38	n.d.		120	n.d.		104	n.d.		55	n.d.		49	n.d.		86
14 - 17 ans	20,0		17,9	s.o.		170	n.d.		15	n.d.		44	n.d.		38	n.d.		21	n.d.		19	n.d.		33
18 - 19 ans	67,6		56,1	s.o.		282	n.d.		22	n.d.		78	n.d.		67	n.d.		33	n.d.		30	n.d.		52

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇌; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADAPTATION SOCIALE (SUITE)																							
24. Population de moins de 18 ans ayant subi de la violence physique (%) 2000																							
Sexes réunis	n.d.	3,2	s.o.		1 962	1,7 {n.s.}		175	2,3 {n.s.}		528	4,3 {n.s.}		437	1,1 {n.s.}		242	1,2 {n.s.}		208	5,7 {+}		372
Garçons	n.d.	3,3	s.o.		1 052	1,2 s.o.		33	3,2 s.o.		273	6,0 s.o.		420	1,2 s.o.		48	1,2 s.o.		40	5,1 s.o.		300
Filles	n.d.	3,0	s.o.		883	2,2 s.o.		59	1,3 s.o.		101	3,2 s.o.		210	0,9 s.o.		35	1,1 s.o.		36	6,4 s.o.		364
25. Taux d'incidence des nouvelles prises en charge des 0-17 ans dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (p. 1 000) 1993-1999	4,4	3,9	(n.s.)		309	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—
26. Taux de jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois (p. 1 000) 2001	56,7	53,8	s.o.		1 284	n.d.		108	n.d.		338	n.d.		273	n.d.		160	n.d.		139	n.d.		249
27. Taux de crimes contre la personne (p. 100 000) 2001																							
Total	988	696	(-)		1 983	n.d.		167	n.d.		537	n.d.		457	n.d.		229	n.d.		193	n.d.		355
Homicide, négligence et tentative	6	1	(n.s.)		3	n.d.		0,3	n.d.		0,8	n.d.		0,7	n.d.		0,4	n.d.		0,3	n.d.		0,6
Voies de fait	543	371	(-)		1 056	n.d.		89	n.d.		286	n.d.		244	n.d.		122	n.d.		103	n.d.		189
Agression sexuelle	50	42	(n.s.)		119	n.d.		10	n.d.		32	n.d.		27	n.d.		14	n.d.		12	n.d.		21
Autres infractions d'ordre sexuel	14	13	(n.s.)		38	n.d.		3	n.d.		10	n.d.		9	n.d.		4	n.d.		4	n.d.		7
Enlèvement ou séquestration	13	7	(n.s.)		20	n.d.		2	n.d.		5	n.d.		5	n.d.		2	n.d.		2	n.d.		4
Vol qualifié ou extorsion	101	25	(-)		72	n.d.		6	n.d.		20	n.d.		17	n.d.		8	n.d.		7	n.d.		13
Harcèlement criminel	49	61	(n.s.)		174	n.d.		15	n.d.		47	n.d.		40	n.d.		20	n.d.		17	n.d.		31
Menaces	211	174	(-)		495	n.d.		42	n.d.		134	n.d.		114	n.d.		57	n.d.		48	n.d.		89
Violence conjugale																							
28. Taux de victimisation pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus (p. 100 000) 2002	434	316	(-)		387	n.d.		33	n.d.		109	n.d.		92	n.d.		45	n.d.		37	n.d.		71
29. Taux de victimisation pour violence conjugale chez les hommes de 12 ans et plus (p. 100 000) 2002	80	44	(-)		54	n.d.		5	n.d.		15	n.d.		13	n.d.		6	n.d.		5	n.d.		10
30. Femmes de 18 ans et plus ayant subi de la violence conjugale (p. 1 000) 2000																							
Violence psychologique ou agression verbale	n.d.	343	s.o.		37 817	337 {n.s.}		3 102	355 {n.s.}		11 117	335 {n.s.}		8 945	257 {n.s.}		3 273	353 {n.s.}		3 712	382 {n.s.}		7 554
Violence physique mineure	n.d.	24	s.o.		2 646	52 {n.s.}		479	22 {n.s.}		689	16 {n.s.}		427	27 {n.s.}		344	34 {n.s.}		358	25 {n.s.}		494
Violence physique sévère	n.d.	8	s.o.		882	11 {n.s.}		101	0 {n.s.}		0	5 {n.s.}		134	5 {n.s.}		64	2 {n.s.}		210	15 {n.s.}		297
31. Hommes de 18 ans et plus ayant subi de la violence conjugale (p. 1 000) 2000																							
Violence psychologique ou agression verbale	n.d.	358	s.o.		38 206	357 {n.s.}		3 302	402 {n.s.}		11 811	312 {n.s.}		7 897	385 {n.s.}		4 824	372 {n.s.}		3 966	328 {n.s.}		6 416
Violence physique mineure	n.d.	54	s.o.		5 763	24 {n.s.}		222	5 {n.s.}		1 469	79 {n.s.}		1 999	55 {n.s.}		689	2 {n.s.}		213	55 {n.s.}		1 076
Violence physique sévère	n.d.	13	s.o.		1 387	5 {n.s.}		46	15 {n.s.}		441	2 {n.s.}		506	0 {n.s.}		0	2 {n.s.}		213	1 {n.s.}		196

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇌; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS																							
Alimentation																							
32. Population de 18 à 74 ans percevant avoir des habitudes alimentaires médiocres (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000																							
Sexes réunis	15,7	13,4	(-)	↘	27 181	10,7	{n.s.}	1 848	15,9	{+}	9 056	9,3	{-}	4 518	13,8	{n.s.}	3 268	11,9	{n.s.}	2 366	15,8	{+}	5 836
Hommes	17,5	15,0	s.o.		15 258	9,9	s.o.	873	17,1	s.o.	4 799	6,6	s.o.	1 586	16,3	s.o.	1 939	13,6	s.o.	1 370	16,4	s.o.	3 043
Femmes	13,9	11,7	s.o.		11 937	12,3	s.o.	1 048	14,8	s.o.	4 259	12,2	s.o.	3 002	11,9	s.o.	1 404	10,0	s.o.	975	15,3	s.o.	2 801
Tabagisme																							
33. Fumeurs actuels de 18 ans et plus (%) 2000																							
Sexes réunis	27,3	29,9	(+)	↘	64 818	30,1	{n.s.}	5 559	30,1	{n.s.}	18 257	31,9	{n.s.}	16 590	27,4	{n.s.}	6 925	29,8	{n.s.}	6 316	28,4	{n.s.}	11 171
Hommes	n.d.	30,4	s.o.		32 443	29,4	s.o.	2 716	31,1	s.o.	9 130	32,9	s.o.	8 334	25,9	s.o.	3 245	31,5	s.o.	3 360	29,0	s.o.	5 679
Femmes	n.d.	29,3	s.o.		32 305	30,9	s.o.	2 847	29,3	s.o.	9 189	30,9	s.o.	8 239	28,5	s.o.	3 631	27,9	s.o.	2 937	27,4	s.o.	5 562
34. Fumeurs quotidiens de 18 ans et plus dont l'âge initial du tabagisme quotidien est inférieur à 15 ans (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000																							
Sexes réunis	41,2	51,4	(+)	↗	29 902	53,8	{n.s.}	2 637	45,8	{n.s.}	7 211	53,3	{n.s.}	8 023	59,7	{n.s.}	3 627	40,4	{-}	2 350	56,7	{n.s.}	5 920
Hommes	44,2	50,6	s.o.		14 624	52,1	s.o.	1 263	49,8	s.o.	3 938	54,7	s.o.	3 845	48,1	s.o.	1 351	36,7	s.o.	1 186	54,7	s.o.	2 979
Femmes	38,1	52,4	s.o.		15 344	55,3	s.o.	1 376	42,5	s.o.	3 351	52,0	s.o.	4 178	70,9	s.o.	2 304	44,4	s.o.	1 137	58,8	s.o.	2 955
35. Fumeurs de 25 cigarettes ou plus par jour chez les 18 ans et plus (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000																							
Sexes réunis	10,9	11,6	(n.s.)	↘	25 221	12,5	{n.s.}	2 309	9,9	{n.s.}	6 003	12,2	{n.s.}	6 327	9,9	{n.s.}	2 507	11,7	{n.s.}	2 481	14,2	{+}	5 582
Hommes	13,5	14,0	s.o.		14 975	13,0	s.o.	1 200	11,7	s.o.	3 431	15,8	s.o.	4 004	10,4	s.o.	1 301	11,5	s.o.	1 225	19,6	s.o.	3 837
Femmes	8,5	9,4	s.o.		10 316	12,3	s.o.	1 130	8,4	s.o.	2 619	8,5	s.o.	2 259	10,4	s.o.	1 330	11,7	s.o.	1 230	8,7	s.o.	1 721
36. Population de 18 ans et plus ayant cessé de fumer (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000																							
Sexes réunis	50,0	56,4	(+)	↗	122 441	53,4	{n.s.}	9 863	53,8	{n.s.}	32 632	56,0	{n.s.}	29 123	58,7	{n.s.}	14 836	58,0	{n.s.}	12 293	60,2	{n.s.}	23 680
Hommes	n.d.	58,0	s.o.		61 925	56,0	s.o.	5 176	54,4	s.o.	15 979	57,4	s.o.	14 520	62,9	s.o.	7 876	59,3	s.o.	6 321	61,1	s.o.	11 947
Femmes	n.d.	54,7	s.o.		60 283	50,6	s.o.	4 662	53,1	s.o.	16 624	54,3	s.o.	14 508	53,4	s.o.	6 798	56,3	s.o.	5 923	59,3	s.o.	12 025
Consommation d'alcool																							
37. Population de 18 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000																							
Sexes réunis	8,4	8,9	(n.s.)	↔	19 219	8,5	{n.s.}	1 577	7,4	{n.s.}	4 496	10,2	{n.s.}	5 306	4,9	{-}	1 241	9,6	{n.s.}	2 040	10,9	{n.s.}	4 276
Hommes	13,3	15,4	s.o.		16 469	12,2	s.o.	1 128	13,3	s.o.	3 914	18,9	s.o.	4 784	9,1	s.o.	1 146	17,1	s.o.	1 827	18,5	s.o.	3 622
Femmes	3,6	2,3	s.o.		2 525	4,6	s.o.	423	1,5	s.o.	463	1,5	s.o.	397	1,6	s.o.	201	3,1	s.o.	322	4,6	s.o.	919

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS (SUITE)																							
<i>38. Population de 18 ans et plus présentant une consommation élevée d'alcool 5 fois ou plus au cours d'une année (%)</i>																							
<i>Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>																							
Sexes réunis	28,6	33,0	(+)	↔	57 109	32,6	{n.s.}	4 813	30,8	{n.s.}	14 855	32,9	{n.s.}	13 651	28,6	{-}	5 842	38,5	{+}	6 566	36,5	{n.s.}	11 334
Hommes	40,1	45,4	s.o.		41 117	47,0	s.o.	3 707	40,4	s.o.	9 942	47,5	s.o.	10 469	40,9	s.o.	4 493	53,2	s.o.	4 808	49,0	s.o.	7 886
Femmes	16,5	19,0	s.o.		15 634	15,8	s.o.	1 086	20,1	s.o.	4 769	17,4	s.o.	3 377	13,9	s.o.	1 311	21,4	s.o.	1 715	23,5	s.o.	3 503
Poids corporel																							
<i>39. Population de 18 ans et plus présentant un excès de poids (%)</i>																							
<i>Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>																							
Sexes réunis	28,8	26,4	(-)	↗	57 304	25,0	{n.s.}	4 618	24,9	{n.s.}	15 102	27,1	{n.s.}	14 096	29,1	{n.s.}	7 343	27,0	{n.s.}	5 726	26,4	{n.s.}	10 398
Hommes	33,2	31,7	s.o.		33 835	31,6	s.o.	2 923	28,4	s.o.	8 342	33,3	s.o.	8 437	34,7	s.o.	4 347	32,8	s.o.	3 498	32,7	s.o.	6 389
Femmes	24,5	21,0	s.o.		23 176	18,2	s.o.	1 674	21,7	s.o.	5 667	21,2	s.o.	5 667	23,1	s.o.	2 947	21,0	s.o.	2 207	20,2	s.o.	4 107
Activité physique																							
<i>40. Population de 18 ans et plus ayant des activités physiques de loisir insuffisantes (%)</i>																							
<i>Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>																							
Sexes réunis	49,2	49,5	{n.s.}	↔	107 383	49,7	{n.s.}	9 180	50,8	{n.s.}	30 813	49,1	{n.s.}	25 518	46,4	{n.s.}	11 737	57,2	{+}	12 119	45,8	{n.s.}	18 015
Hommes	47,7	51,2	s.o.		54 641	44,8	s.o.	4 144	54,2	s.o.	15 937	46,1	s.o.	11 664	46,5	s.o.	5 825	63,2	s.o.	6 733	52,7	s.o.	10 304
Femmes	50,6	47,7	s.o.		52 592	53,8	s.o.	4 953	47,3	s.o.	14 803	51,2	s.o.	13 671	46,0	s.o.	5 862	51,5	s.o.	5 419	39,3	s.o.	7 780
Grossesses																							
<i>41. Taux de césarienne (pour 100 accouchements) 1999-2001</i>																							
Selon le centre hospitalier d'accouchement	18,0	16,4	(-)		421	—		—	16,1	(-)	235	—		—	15,4	{n.s.}	59	16,8	{n.s.}	42	18,3	{n.s.}	85
Selon le CLSC de résidence de la mère	18,0	16,7	(-)		412	15,5	{n.s.}	31	15,2	{n.s.}	96	17,1	{n.s.}	103	16,5	{n.s.}	56	18,2	{n.s.}	45	18,4	{n.s.}	82
<i>42. Indice synthétique de grossesse (grossesses par femme) 1997-1998</i>	2,2	2,1	s.o.		3 895	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	
Naissances vivantes																							
<i>43. Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine (%)</i>																							
<i>Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004</i>																							
<i>44. Naissances de faible poids (%)</i>	6,9	6,8	s.o.		466	5,0	s.o.	27	6,2	s.o.	109	5,8	s.o.	99	7,5	s.o.	58	11,7	s.o.	78	6,9	s.o.	95
<i>Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004</i>																							
Total, moins de 2 500g	5,5	5,4	s.o.		376	4,4	s.o.	25	4,8	s.o.	94	5,0	s.o.	85	5,5	s.o.	46	7,6	s.o.	57	4,7	s.o.	69
Moins de 1 500g	0,9	0,9	s.o.		44	0,9	s.o.	5	0,5	s.o.	10	0,4	s.o.	7	0,5	s.o.	4	1,3	s.o.	10	0,5	s.o.	8
1 500 - 2 499g	4,6	4,5	s.o.		332	3,5	s.o.	20	4,3	s.o.	84	4,6	s.o.	78	5,0	s.o.	42	6,2	s.o.	47	4,1	s.o.	61

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS (SUITE)																							
45. Naissances prématurées (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004	7,5	7,4	s.o.		540	7,2	s.o.	41	7,8	s.o.	152	8,3	s.o.	141	7,6	s.o.	64	6,9	s.o.	52	6,1	s.o.	90
46. Répartition des naissances selon la scolarité de la mère (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004																							
Moins de 11 ans	13,0	10,6	s.o.		750	14,7	s.o.	82	8,2	s.o.	157	8,0	s.o.	132	14,2	s.o.	118	14,4	s.o.	102	11,1	s.o.	159
11 - 15 ans	55,2	58,7	s.o.		4 156	60,0	s.o.	334	55,4	s.o.	1 058	59,9	s.o.	985	57,3	s.o.	476	61,8	s.o.	439	60,3	s.o.	864
16 ans et plus	31,7	30,8	s.o.		2 179	25,3	s.o.	141	36,7	s.o.	696	32,1	s.o.	528	28,4	s.o.	236	23,8	s.o.	169	28,6	s.o.	409
SERVICES DE SANTÉ																							
47.0 Dépenses per capita en service de santé (\$) 2002-2003	2742	2412	(-)		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—
Services préventifs																							
47. Taux de participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans (%) 2001	51,2	59,2	s.o.		17 974	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—
48. Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie (%) 1999-2000	63,0	60,0	(n.s.)	↗	14 519	52,0		1 284	63,0		1 238	54,0		4 172	63,0	s.o.	2 350	67,0	s.o.	1 906	63,0	s.o.	3 569
49. Femmes de 15 ans et plus ayant subi un test de PAP (%) 1998	63,4	52,5	(-)	↘	61 092	n.d.		5 103	n.d.		17 273	n.d.		14 721	n.d.		7 098	n.d.		5 883	n.d.		11 012
50. Personnes de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe (%) Qc : 2001-2002; SLSJ : 2002-2003	58,0	75,9	s.o.		27 031	100,0	s.o.	3 050	76,6	s.o.	7 470	70,7	s.o.	6 407	66,1	s.o.	2 576	61,7	s.o.	2 006	82,3	s.o.	5 522
Services de première ligne																							
51. Population ayant consommé trois médicaments différents et plus (%) 1998																							
Sexes réunis	17,0	16,2	(n.s.)	↗	45 078	n.d.		3 874	n.d.		12 498	n.d.		10 642	n.d.		5 320	n.d.		4 358	n.d.		8 385
Hommes	12,2	10,6	s.o.		14 643	n.d.		1 277	n.d.		4 015	n.d.		3 428	n.d.		1 736	n.d.		1 482	n.d.		2 703
Femmes	21,7	21,9	s.o.		30 691	n.d.		2 598	n.d.		8 602	n.d.		7 306	n.d.		3 605	n.d.		2 998	n.d.		5 582
52. Population de 15 ans et plus qui a utilisé Info-Santé CLSC (%) 1998																							
Sexes réunis	23	29	(+)		65 644	n.d.		5 578	n.d.		18 310	n.d.		15 647	n.d.		7 691	n.d.		6 464	n.d.		11 959
Hommes	16	20	(+)		21 451	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—
Femmes	30	37	(+)		41 015	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—	n.d.		—
53. Personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (%) 2001																							
Sexes réunis	17,4	19,5	s.o.		44 735	21,0	s.o.	4 090	18,5	s.o.	11 855	19,9	s.o.	10 880	20,9	s.o.	5 610	18,7	s.o.	4 110	19,3	s.o.	8 180
Hommes	14,5	16,1	s.o.		18 195	17,4	s.o.	1 700	15,2	s.o.	4 740	16,7	s.o.	4 460	17,0	s.o.	2 270	15,0	s.o.	1 655	15,9	s.o.	3 375
Femmes	20,1	22,8	s.o.		26 530	24,8	s.o.	2 405	21,6	s.o.	7 115	22,9	s.o.	6 430	24,7	s.o.	3 335	22,4	s.o.	2 450	22,6	s.o.	4 805

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇌; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs socio-sanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires socio-sanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
SERVICES DE SANTÉ (SUITE)																							
<i>54. Nombre de médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale par 100 000 habitants</i>																							
<i>a. Inscrits à la RAMQ au 31 décembre 2001</i>																							
Ensemble des médecins et dentistes	245	198	s.o.		568	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Spécialistes	100	69	s.o.		198	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Omnipraticiens	100	94	s.o.		269	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale	45	35	s.o.		101	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
<i>b. Médecins actifs résidents au 31 mars 2003</i>																							
Ensemble des médecins	n.d.	155	s.o.		441	90	s.o.	22	252	s.o.	200	89	s.o.	60	165	s.o.	55	117	s.o.	32	136	s.o.	72
Spécialistes	n.d.	63	s.o.		180	0	s.o.	0	144	s.o.	114	15	s.o.	10	63	s.o.	21	26	s.o.	7	53	s.o.	28
Omnipraticiens	n.d.	92	s.o.		261	90	s.o.	22	108	s.o.	86	74	s.o.	50	102	s.o.	34	91	s.o.	25	83	s.o.	44
<i>55. Taux de participation de la population en médecine et chirurgie (%) 2001</i>																							
Ensemble des services	80,6	81,6	s.o.		227 771	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Examens des malades ambulatoires	78,6	79,9	s.o.		223 055	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Examens en cabinet	71,0	72,5	s.o.		202 501	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Examens en clinique externe et en urgence	36,0	39,0	s.o.		108 971	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Examens à domicile	1,6	4,5	s.o.		12 486	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Services hospitaliers																							
<i>56. Pourcentage de séjours excessifs à l'urgence (%) 2001-2002</i>																							
24 heures et plus	n.d.	7,8	s.o.		4 031	15,8	s.o.	588	6,9	s.o.	1 559	10,2	s.o.	891	12,0	s.o.	630	7,1	s.o.	261	1,3	s.o.	102
24 à 47 heures	n.d.	7,0	s.o.		3 591	11,6	s.o.	432	6,7	s.o.	1 511	9,2	s.o.	802	9,4	s.o.	490	7,0	s.o.	255	1,3	s.o.	101
48 heures et plus	n.d.	0,9	s.o.		440	4,2	s.o.	156	0,2	s.o.	48	1,0	s.o.	89	2,7	s.o.	140	0,2	s.o.	6	0,0	s.o.	1
<i>57. Taux d'hospitalisations jugées évitables (p. 10 000) 1996-2001</i>																							
a. Taux brut total	54,2	55,3	(n.s.)		1 603	47,2	(-)	119	48,6	(-)	393	49,4	(-)	337	69,9	(+)	239	63,5	(+)	179	62,9	(+)	335
<i>b. Taux selon la condition médicale (CIM-9)</i>																							
Appendice rompu, tous âges (540.0)	2,5	3,2	(+)		91	2,0	(n.s.)	5	2,6	(n.s.)	21	2,1	(-)	14	3,3	(n.s.)	11	2,8	(n.s.)	8	6,0	(+)	32
Pneumonie, 5 - 49 ans (480-486, 487.0)	4,0	6,1	(+)		178	4,7	(n.s.)	12	5,5	(+)	44	5,5	(+)	38	7,6	(+)	26	7,9	(+)	22	6,7	(+)	36
Insuffisance cardiaque, 18 ans et plus (428)	17,7	14,4	(-)		418	11,1	(-)	28	11,0	(-)	89	15,1	(-)	103	18,1	(n.s.)	62	16,3	(n.s.)	46	17,0	(n.s.)	91
Gangrène, 18 ans et plus (785.4)	0,8	0,7	(n.s.)		20	0,6	(n.s.)	1	0,5	(-)	4	0,4	(-)	3	0,9	(n.s.)	3	1,4	(+)	4	0,8	(n.s.)	4
Maladies évitables par immunisation, 18 ans et plus (032, 037, 041.2, 041.5, 070.2, 070.3)	0,1	0,1	(-)		2	0,0	(n.s.)	0	0,1	(n.s.)	0,6	0,1	(n.s.)	0,6	0,0	(n.s.)	0	0,1	(n.s.)	0,2	0,1	(n.s.)	0,4

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇌; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs socio-sanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires socio-sanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est								
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an							
																							A	A	B	C	D	A	B
SERVICES DE SANTÉ (SUITE)																													
b. Taux selon la condition médicale (CIM-9) (suite)																													
Pyélonéphrite, 18 ans et plus (590)	4,5	5,2 (+)			150	5,2 (n.s.)			13	4,4 (n.s.)			36	5,3 (n.s.)			36	8,6 (+)			29	6,2 (+)			17	3,4 (-)			18
Hernie abdominale en occlusion, 18 ans et plus (552)	1,1	0,9 (-)			26	0,8 (n.s.)			2	0,8 (-)			6	0,6 (-)			4	1,8 (+)			6	0,9 (n.s.)			3	0,9 (n.s.)			5
Asthme, 5 - 49 ans (493)	4,7	7,1 (+)			205	7,0 (+)			18	9,0 (+)			73	5,3 (n.s.)			36	7,1 (+)			24	5,9 (n.s.)			17	7,1 (+)			38
Cellulite, 18 ans et plus (682)	6,3	4,3 (-)			125	2,4 (-)			6	3,5 (-)			28	4,6 (-)			31	5,6 (n.s.)			19	3,9 (-)			11	5,6 (n.s.)			30
Diabète, 18 ans et plus (250)	6,3	6,4 (n.s.)			185	7,1 (n.s.)			18	4,6 (-)			37	5,5 (n.s.)			38	10,1 (+)			35	8,6 (+)			24	6,3 (n.s.)			34
Hypokaliémie, 18 ans et plus (276.8)	0,2	0,3 (+)			9	0,4 (n.s.)			1	0,2 (n.s.)			2	0,4 (+)			3	0,1 (n.s.)			0,2	0,6 (+)			2	0,3 (n.s.)			2
Hypertension maligne, 18 ans et plus (401.0, 402.0, 403.0, 404.0, 405.0)	0,1	0,1 (n.s.)			4	0,1 (n.s.)			0,2	0,0 (n.s.)			0	0,0 (-)			0,2	0,1 (n.s.)			0,2	1,1 (+)			3	0,0 (n.s.)			0
Ulcère perforé ou avec hémorragie, 18 ans et plus (531-534, sauf 4e position = 3, 7, 9)	2,5	2,3 (n.s.)			67	2,8 (n.s.)			7	2,4 (n.s.)			20	1,9 (-)			13	2,4 (n.s.)			8	2,3 (n.s.)			7	2,3 (n.s.)			12
Phlébite sans embolie pulmonaire, 18 ans et plus (451 sauf si diagnostic secondaire = 415.1)	3,3	4,2 (+)			123	3,0 (n.s.)			8	4,1 (+)			33	2,6 (-)			18	4,3 (n.s.)			15	5,4 (+)			15	6,5 (+)			34
58. Durée moyenne de séjour en soins physiques de courte durée (jours d'hospitalisation) 1999-2001																													
Toutes causes (CIM-9: 000-999)																													
Tumeurs (140-239)	7,1	6,9 s.o.			190 763	10,6 s.o.			4 678	6,8 s.o.			91 826	9,9 s.o.			22 441	6,4 s.o.			24 841	6,5 s.o.			16 230	5,9 s.o.			30 746
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	10,8	10,3 s.o.			22 913	12,6 s.o.			645	10,2 s.o.			13 566	12,0 s.o.			2 096	11,2 s.o.			2 655	10,8 s.o.			1 154	8,2 s.o.			2 796
Lésions traumatiques et empoisonnements (800-999)	9,2	9,2 s.o.			38 281	10,9 s.o.			701	9,8 s.o.			19 417	9,0 s.o.			4 927	9,1 s.o.			4 814	8,1 s.o.			3 478	8,2 s.o.			4 945
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	8,5	8,6 s.o.			19 174	12,5 s.o.			212	9,2 s.o.			10 211	11,1 s.o.			1 218	8,5 s.o.			2 658	9,1 s.o.			754	7,0 s.o.			4 120
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	6,8	6,4 s.o.			23 683	10,2 s.o.			1 646	6,1 s.o.			9 404	8,8 s.o.			3 251	5,7 s.o.			3 167	6,1 s.o.			2 567	5,4 s.o.			3 648
Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	6,0	5,5 s.o.			18 981	8,2 s.o.			351	6,0 s.o.			8 347	5,9 s.o.			1 662	4,9 s.o.			2 598	4,4 s.o.			1 996	5,2 s.o.			4 026
59. Taux d'interventions dites pertinentes (p. 10 000) 1998-2001																													
Total des interventions pertinentes																													
Traitement pour cataracte (CCADTC: 27.3, 27.4, 27.6)	133,0	134,2 (n.s.)			2 991	119,2 (-)			227	136,3 (n.s.)			856	134,2 (n.s.)			717	123,4 (-)			318	156,9 (+)			333	133,0 (n.s.)			540
Traitement de la rétinopathie (CCADTC: 28.4, 28.6)	79,9	91,1 (+)			2 031	81,6 (n.s.)			155	93,6 (+)			588	90,8 (+)			485	83,4 (n.s.)			215	101,3 (+)			215	91,8 (+)			372
Angioplastie (CCADTC: 48.0)	2,8	2,7 (n.s.)			61	1,9 (n.s.)			4	2,2 (n.s.)			14	2,9 (n.s.)			15	2,8 (n.s.)			7	2,5 (n.s.)			5	3,8 (n.s.)			15
Pontage coronarien (CCADTC: 48.1)	18,0	14,1 (-)			314	11,6 (-)			22	16,2 (-)			102	11,9 (-)			63	13,9 (-)			36	21,2 (n.s.)			45	11,4 (-)			46
Implantation d'un pacemaker (CCADTC: 49.7, 49.8)	10,3	8,4 (-)			187	7,0 (-)			13	8,2 (-)			51	10,5 (n.s.)			56	6,9 (-)			18	7,5 (-)			16	8,0 (-)			32
Remplacement total de hanche (CCADTC: 93.5)	8,6	4,8 (-)			107	5,4 (-)			10	5,1 (-)			32	4,7 (-)			25	3,8 (-)			10	5,3 (-)			11	4,4 (-)			18
Remplacement de la tête du fémur (CCADTC: 93.6)	5,2	4,8 (n.s.)			107	2,6 (-)			5	3,5 (-)			22	4,7 (n.s.)			25	6,7 (n.s.)			17	8,3 (+)			18	4,8 (n.s.)			20
Remplacement total du genou (CCADTC: 93.41, 93.43)	3,1	2,2 (-)			48	1,6 (-)			3	2,0 (-)			13	2,6 (n.s.)			14	0,9 (-)			2	1,7 (-)			4	3,2 (n.s.)			13

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇌; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi		Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est			
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
SERVICES DE SANTÉ (SUITE)																							
<i>60. Taux de mortalité évitable (p. 100 000) 1994-1998</i>																							
a. Taux brut total	55,4	55,9 (n.s.) 146				40,8 (-) 9			65,5 (+) 40		60,7 (n.s.) 44			46,7 (n.s.) 14			52,5 (n.s.) 13			51,6 (n.s.) 25			
b. Taux selon la cause (CIM-9)																							
Tuberculose, 5-64 ans (010-018; 137)	0,1	0,0 (n.s.) 0,0				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			
Cancer du col l'utérus, 15-64 ans (180)	1,9	1,6 (n.s.) 1,6				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		1,4 (n.s.) 0,4			3,5 (n.s.) 0,4			0,0 (n.s.) 0,0			4,5 (n.s.) 0,8			
Cancer du col et du corps de l'utérus, 15-54 ans (179-180; 182)	2,4	2,6 (n.s.) 2,2				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		2,5 (n.s.) 0,6			4,0 (n.s.) 0,4			2,4 (n.s.) 0,2			6,6 (n.s.) 1,0			
Maladie de Hodgkin, 5-64 ans (201)	0,3	0,4 (n.s.) 1,0				0,9 (n.s.) 0,2			0,7 (n.s.) 0,4		0,6 (n.s.) 0,4			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			
Cardiopathies rhumatismales chroniques, 5-44 ans (393-398)	0,1	0,0 (n.s.) 0,0				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			
Maladies respiratoires des enfants, 1-14 ans (460-519)	0,8	0,4 (n.s.) 0,2				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			1,9 (n.s.) 0,2			
Asthme, 5-44 ans (493)	0,2	0,6 (n.s.) 1,0				1,2 (n.s.) 0,2			0,5 (n.s.) 0,2		1,2 (n.s.) 0,6			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			
Appendicite, 5-64 ans (540-543)	0,0	0,0 (n.s.) 0,0				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			
Hernie abdominale, 5-64 ans (550-553)	0,1	0,0 (n.s.) 0,0				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			
Cholélithiase et cholécystite, 5-64 ans (574-575,1; 576.1)	0,1	0,1 (n.s.) 0,2				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,8 (n.s.) 0,2			0,0 (n.s.) 0,0			
Mal. hypertensives et MVC, 35-64 ans (401-405; 430-438)	13,2	15,1 (n.s.) 17,8				4,0 (-) 0,4			19,6 (n.s.) 5,6		16,2 (n.s.) 5,4			8,8 (n.s.) 1,2			16,3 (n.s.) 1,8			16,0 (n.s.) 3,4			
Mortalité maternelle (630-676) p. 100 000 naissances totales	2,6	0,0 (n.s.) 0,0				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			
Mortalité périnatale (000-999) p. 100 000 naissances totales	716,6	777,5 (n.s.) 23,4				569,0 (n.s.) 1,6			727,0 (n.s.) 5,0		973,7 (n.s.) 8,0			1042,2 (n.s.) 4,0			743,2 (n.s.) 2,2			482,0 (n.s.) 2,6			
Cancer du sein, 25-64 ans (174)	26,8	29,1 (n.s.) 22,6				14,7 (n.s.) 1,0			32,0 (n.s.) 6,0		35,2 (n.s.) 7,8			31,1 (n.s.) 2,8			22,3 (n.s.) 1,6			24,4 (n.s.) 3,4			
Cardiopathies ischémiques, 35-64 ans (410-414; 429.2)	64,2	65,3 (n.s.) 77,0				59,9 (n.s.) 6,0			79,0 (+) 22,6		64,4 (n.s.) 21,4			42,3 (-) 5,8			67,0 (n.s.) 7,4			64,8 (n.s.) 13,8			
Ulcères peptiques, 25-64 ans (531-534)	0,5	0,1 (-) 0,2				0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0		0,0 (n.s.) 0,0			1,1 (n.s.) 0,2			0,0 (n.s.) 0,0			0,0 (n.s.) 0,0			
<i>61. Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (%) 2000-2001</i>																							
Pour les centres hospitaliers de la région	n.d.	94,7 s.o. 28 531				94,9 s.o. 1 993			94,5 s.o. 7 121		94,5 s.o. 5 924			95,1 s.o. 3 914			94,2 s.o. 3 580			95,1 s.o. 5 999			
Pour le centre hospitalier du territoire de CLSC	—	—				24,2 s.o. —			91,8 s.o. —		38,9 s.o. —			80,6 s.o. —			80,6 s.o. —			72,2 s.o. —			
<i>62. Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (%) 2000-2001</i>																							
	82,8	95,3 s.o. 28 359				98,6 s.o. 490			50,4 s.o. 12 967		89,3 s.o. 2 579			79,6 s.o. 3 966			92,3 s.o. 2 799			87,1 s.o. 5 558			
<i>63. Taux d'admission dans un CHSLD (pour 100 lits) Qc : 1999; SLSJ : 2002</i>																							
	32,4	33,4 s.o. 437				24,3 s.o. 33			37,3 s.o. 110		38,4 s.o. 113			25,4 s.o. 52			35,9 s.o. 56			32,6 s.o. 55			
<i>64. Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un CHSLD (en jours) Qc : 1999; SLSJ : 2002</i>																							
	63,0	25,0 s.o. —				3,7 s.o. —			15,7 s.o. —		11,9 s.o. —			99,7 s.o. —			38,0 s.o. —			5,9 s.o. —			
<i>65. Population de 65 ans et plus en institution de santé (%) 1996</i>																							
	8,3	9,0 s.o. 2 710				7,6 s.o. 190			7,7 s.o. 635		6,7 s.o. 510			13,0 s.o. 445			12,4 s.o. 360			10,3 s.o. 565			

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇌; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec			Saguenay-Lac-St-Jean			La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	
ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL																								
<i>66. Population de 18 ans et plus percevant son état de santé comme médiocre (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>																								
Sexes réunis	11,3	10,8 (n.s.)	↘		23 429	7,9 {n.s.}	1 458		11,9 {n.s.}	7 235	11,1 {n.s.}	5 762	10,0 {n.s.}	2 539	8,1 {n.s.}	1 718	11,8 {n.s.}	4 643						
Hommes	10,6	11,1 s.o.			11 846	7,0 s.o.	648		13,4 s.o.	3 937	9,9 s.o.	2 509	8,7 s.o.	1 091	9,2 s.o.	977	13,5 s.o.	2 642						
Femmes	11,9	10,5 s.o.			11 577	8,6 s.o.	788		10,7 s.o.	3 341	11,9 s.o.	3 183	11,1 s.o.	1 418	7,0 s.o.	738	10,3 s.o.	2 038						
<i>67. Espérance de vie à la naissance (en années) 1995-1999</i>																								
Sexes réunis	77,9	76,7 (-)			—	76,7 (-)	—		76,8 (-)	—	76,3 (-)	—	76,8 (-)	—	76,7 (-)	—	76,9 (-)	—						
Hommes	74,6	73,4 (-)			—	73,9 (n.s.)	—		73,4 (-)	—	73,0 (-)	—	73,5 (-)	—	73,0 (-)	—	74,0 (n.s.)	—						
Femmes	81,1	79,9 (-)			—	79,6 (-)	—		80,0 (-)	—	79,5 (-)	—	80,2 (n.s.)	—	80,9 (n.s.)	—	79,9 (-)	—						
<i>68. Espérance de vie en bonne santé - sans limitations d'activités (en années) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>																								
Sexes réunis	66,8	66,9 s.o.			—	67,3 s.o.	—		67,1 s.o.	—	67,0 s.o.	—	66,3 s.o.	—	66,5 s.o.	—	66,8 s.o.	—						
Hommes	65,4	65,4 s.o.			—	66,1 s.o.	—		65,4 s.o.	—	65,4 s.o.	—	64,7 s.o.	—	64,8 s.o.	—	65,6 s.o.	—						
Femmes	68,1	68,4 s.o.			—	68,4 s.o.	—		68,7 s.o.	—	68,5 s.o.	—	67,9 s.o.	—	68,4 s.o.	—	68,0 s.o.	—						
<i>69. Taux de mortalité selon l'âge (p. 100 000) 1998-2002</i>																								
0 - 4 ans	79	69 (n.s.)	↘		17	82 (n.s.)	2		56 (n.s.)	4	59 (n.s.)	3	82 (n.s.)	3	96 (n.s.)	2	68 (n.s.)	3						
5 - 14 ans	10	14 (+)	↘		9	10 (n.s.)	1		16 (n.s.)	3	11 (n.s.)	2	15 (n.s.)	1	9 (n.s.)	1	17 (n.s.)	2						
15 - 24 ans	44	41 (n.s.)	↔		33	51 (n.s.)	3		48 (n.s.)	11	23 (-)	4	47 (n.s.)	5	37 (n.s.)	3	47 (n.s.)	7						
25 - 44 ans	75	70 (-)	↔		105	61 (n.s.)	8		64 (-)	27	65 (n.s.)	23	67 (n.s.)	12	80 (n.s.)	11	89 (n.s.)	24						
45 - 64 ans	357	298 (-)	↘		394	296 (-)	31		293 (-)	112	323 (-)	105	291 (-)	45	283 (-)	35	283 (-)	67						
65 - 74 ans	1 479	1 211 (-)	↘		463	1 395 (n.s.)	44		1 205 (-)	123	1 284 (-)	123	1 137 (-)	49	1 214 (-)	42	1 087 (-)	81						
75 ans et plus	4 919	4 221 (-)	↘		1 001	4 144 (-)	79		4 253 (-)	283	4 257 (-)	251	4 526 (n.s.)	120	4 139 (-)	96	4 009 (-)	171						
Taux brut, tous âges	525	391 (n.s.)	↗		2 023	378 (n.s.)	169		390 (n.s.)	562	419 (n.s.)	511	386 (n.s.)	234	381 (n.s.)	191	373 (n.s.)	356						
Taux ajusté, tous âges	600	524 (-)	↘		2 023	536 (-)	169		524 (-)	562	539 (-)	511	534 (-)	234	514 (-)	191	498 (-)	356						
<i>70. Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 1995-1999</i>																								
Taux de mortalité infantile (moins d'un an)	5,2	5,5 (n.s.)			16	5,5 (n.s.)	1		7,0 (n.s.)	6	4,6 (n.s.)	3	8,4 (n.s.)	3	4,2 (n.s.)	1	3,9 (n.s.)	2						
Taux de mortalité néonatale précoce (0 - 6 jours)	3,0	3,2 (n.s.)			9	3,2 (n.s.)	0,8		3,9 (n.s.)	4	3,1 (n.s.)	2	4,5 (n.s.)	2	2,1 (n.s.)	0,6	2,3 (n.s.)	1						
Taux de mortalité néonatale tardive (7 - 27 jours)	0,6	0,9 (n.s.)			3	0,9 (n.s.)	0,2		1,3 (n.s.)	0,8	0,6 (n.s.)	0,6	1,1 (n.s.)	0,2	2,1 (+)	0,8	0,0 (n.s.)	0						
Taux de mortalité post-néonatale (28 - 364 jours)	1,5	1,4 (n.s.)			4	0,8 (n.s.)	0,2		1,8 (n.s.)	1	0,9 (n.s.)	0,6	2,8 (n.s.)	1	0,0 (n.s.)	0	1,6 (n.s.)	0,8						

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire - Le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ses territoires sociosanitaires

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL (SUITE)																							
<i>71. Mortalité périnatale (pour 1 000 naissances totales) 1995-1999</i>																							
Taux de mortalité périnatale	7,1	7,2	s.o.		20	6,2	s.o.	2	6,1	s.o.	6	6,1	s.o.	4	10,5	s.o.	4	5,6	s.o.	2	5,8	s.o.	3
Taux de mortinatalité	4,1	4,0	s.o.		11	3,9	s.o.	1	3,1	s.o.	3	3,1	s.o.	2	6,1	s.o.	2	3,5	s.o.	1	3,5	s.o.	2
ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE																							
Limitations d'activités																							
<i>72. Population ayant une limitation d'activités à long terme (%) 1998</i>																							
Sexes réunis	9,3	6,9	(-) ⇔		19 200	n.d.	1 650		n.d.	5 323		n.d.	4 533		n.d.	2 266		n.d.	1 856		n.d.	3 571	
Hommes	8,2	6,1	s.o.		8 427	n.d.	735		n.d.	2 310		n.d.	1 972		n.d.	999		n.d.	853		n.d.	1 556	
Femmes	10,4	7,8	s.o.		10 931	n.d.	925		n.d.	3 064		n.d.	2 602		n.d.	1 284		n.d.	1 068		n.d.	1 988	
Prévalence et incidence des problèmes																							
<i>73. Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MADO) (p. 100 000) Qc : 1995-1999; SLSJ : 1997-2001</i>																							
Salmonellose	17,5	17,7	s.o.		51	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Amibiase	3,1	0,6	s.o.		2	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Giardiase	12,9	8,6	s.o.		25	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
E. Coli O157:H7	5,0	11,3	s.o.		33	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Hépatite C	22,8	13,0	s.o.		38	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Tuberculose	4,6	2,0	s.o.		6	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Coqueluche	36,8	8,1	s.o.		23	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Scarlatine	12,7	17,3	s.o.		50	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Infection à streptocoque pneumoniae	6,0	8,8	s.o.		26	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Infection à campylobacter	40,8	67,1	s.o.		194	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Infection gonococcique	7,5	1,6	s.o.		5	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	
Chlamydiase	96,7	98,9	s.o.		287	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—	

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec			Saguenay-Lac-St-Jean			La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	
ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)																								
<i>74. a. Prévalence des principaux problèmes de santé (%) 1998</i>																								
Maux de tête	11,8	11,4	(n.s.)	↗	31 722	n.d.		2 726	n.d.		8 795	n.d.		7 489	n.d.		3 744	n.d.		3 067	n.d.		5 901	
Arthrite ou rhumatisme	11,8	11,2	(n.s.)	↗	31 165	n.d.		2 679	n.d.		8 641	n.d.		7 358	n.d.		3 678	n.d.		3 013	n.d.		5 797	
Maux de dos ou de la colonne	10,2	7,6	(-)	↗	21 148	n.d.		1 818	n.d.		5 863	n.d.		4 993	n.d.		2 496	n.d.		2 044	n.d.		3 934	
Rhinite allergique	9,4	6,4	(-)	↗	17 809	n.d.		1 531	n.d.		4 938	n.d.		4 204	n.d.		2 102	n.d.		1 722	n.d.		3 313	
Allergies ou affections cutanées	9,1	8,0	(n.s.)	↔	22 261	n.d.		1 913	n.d.		6 172	n.d.		5 256	n.d.		2 627	n.d.		2 152	n.d.		4 141	
Autres allergies	10,3	10,4	(n.s.)	↔	28 939	n.d.		2 487	n.d.		8 024	n.d.		6 832	n.d.		3 415	n.d.		2 798	n.d.		5 383	
Hypertension artérielle	8,5	9,0	(n.s.)	↗	25 043	n.d.		2 152	n.d.		6 944	n.d.		5 912	n.d.		2 956	n.d.		2 421	n.d.		4 658	
Maladies cardiaques	4,6	4,2	(n.s.)	↔	11 687	n.d.		1 004	n.d.		3 240	n.d.		2 759	n.d.		1 379	n.d.		1 130	n.d.		2 174	
Troubles digestifs fonctionnels	5,0	5,5	(n.s.)	↔	15 304	n.d.		1 315	n.d.		4 243	n.d.		3 613	n.d.		1 806	n.d.		1 480	n.d.		2 847	
Asthme	5,0	5,3	(n.s.)	↗	14 748	n.d.		1 268	n.d.		4 089	n.d.		3 482	n.d.		1 740	n.d.		1 426	n.d.		2 743	
Autres affections respiratoires	5,4	5,5	(n.s.)	↗	15 304	n.d.		1 315	n.d.		4 243	n.d.		3 613	n.d.		1 806	n.d.		1 480	n.d.		2 847	
<i>b. Prévalence du diabète (%), ajustée selon l'âge 2001-2002</i>	5,8	5,2	(-)	↗	10 998	5,5	(n.s.)	949	5,3	(-)	3 129	5,4	(-)	2 836	4,8	(-)	1 134	4,7	(-)	907	5,3	(-)	2 043	
Morbidité selon la cause																								
<i>75. Taux ajusté d'hospitalisation selon le diagnostic principal (p. 100 000) 1998-2001</i>																								
Toutes causes (CIM-9: 000-999)	8 390	10 041	s.o.		27 857	8 476	s.o.	1 985	9 182	s.o.	7 096	8 823	s.o.	5 882	12 579	s.o.	3 353	11 853	s.o.	3 824	11 173	s.o.	5 718	
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	1 415	1 472	s.o.		4 195	1 102	s.o.	258	1 161	s.o.	915	1 407	s.o.	996	1 991	s.o.	538	2 022	s.o.	658	1 588	s.o.	831	
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	906	1 356	s.o.		3 627	1 292	s.o.	296	1 320	s.o.	980	1 134	s.o.	725	1 639	s.o.	420	1 609	s.o.	505	1 411	s.o.	701	
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	974	1 241	s.o.		3 509	927	s.o.	224	1 142	s.o.	898	893	s.o.	606	1 740	s.o.	470	1 536	s.o.	505	1 537	s.o.	806	
Tumeurs (140-239)	754	804	s.o.		2 330	762	s.o.	185	834	s.o.	673	774	s.o.	549	742	s.o.	202	858	s.o.	284	819	s.o.	437	
Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	534	769	s.o.		2 190	773	s.o.	187	763	s.o.	609	740	s.o.	502	892	s.o.	241	704	s.o.	232	800	s.o.	418	
Traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	666	766	s.o.		2 180	612	s.o.	147	686	s.o.	543	649	s.o.	445	844	s.o.	233	772	s.o.	255	1 065	s.o.	557	
<i>76. Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels (p. 10 000) 1998-2001</i>	66	81	s.o.		2 295	64	s.o.	153	85	s.o.	669	60	s.o.	412	89	s.o.	295	89	s.o.	248	100	s.o.	519	
Total (CIM-9: E800-E949)	66	81	s.o.		2 295	64	s.o.	153	85	s.o.	669	60	s.o.	412	89	s.o.	295	89	s.o.	248	100	s.o.	519	
Chutes accidentelles (E880-E888)	28	30	s.o.		823	26	s.o.	60	28	s.o.	216	23	s.o.	155	32	s.o.	103	34	s.o.	93	38	s.o.	195	
Occupants de véhicules moteur (E810-E819)	7	9	s.o.		255	9	s.o.	23	7	s.o.	55	6	s.o.	43	11	s.o.	36	12	s.o.	35	12	s.o.	63	
Cyclistes (E826.1)	1	1	s.o.		41	1	s.o.	3	1	s.o.	10	0,9	s.o.	6	2	s.o.	6	1	s.o.	3	2	s.o.	12	
Intoxications accidentelles (E850-E869)	1	1	s.o.		32	0,3	s.o.	0,7	1	s.o.	10	0,8	s.o.	5	3	s.o.	8	0,1	s.o.	0,3	1	s.o.	7	
Incendies et brûlures (E890-E899, E924)	0,7	0,6	s.o.		18	0,7	s.o.	2	0,4	s.o.	4	0,2	s.o.	2	0,4	s.o.	1	1	s.o.	3	1	s.o.	7	

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)																							
<i>77. Taux ajusté d'incidence des cancers (p. 100 000) 1997-2001</i>																							
Ensemble des sièges (CIM-9: 140-208)	493	519 (+)	↔		1 353	509 (n.s.)	109		529 (+)	384	530 (+)	338	526 (n.s.)	157	485 (n.s.)	120	506 (n.s.)	245					
Sein chez la femme (174)	128	139 (+)	↗		199	121 (n.s.)	14		155 (+)	63	131 (n.s.)	47	131 (n.s.)	21	123 (n.s.)	16	147 (n.s.)	38					
Prostate (185)	104	96 (-)	↔		102	125 (n.s.)	11		103 (n.s.)	29	106 (n.s.)	27	84 (n.s.)	10	55 (-)	6	89 (n.s.)	19					
Poumon (162)	83	93 (+)	↔		239	105 (+)	22		79 (n.s.)	58	97 (n.s.)	62	109 (+)	32	90 (n.s.)	22	88 (n.s.)	43					
Côlon et rectum (153-154)	63	71 (+)	↔		182	62 (n.s.)	13		75 (+)	54	68 (n.s.)	43	88 (+)	26	77 (n.s.)	19	56 (n.s.)	27					
Vessie (188)	24	25 (n.s.)	↔		64	26 (n.s.)	6		24 (n.s.)	17	27 (n.s.)	17	18 (n.s.)	5	27 (n.s.)	7	27 (n.s.)	13					
Estomac (151)	11	13 (n.s.)	↘		33	22 (+)	4		9 (n.s.)	12	7 (n.s.)	11	14 (n.s.)	4	17 (n.s.)	4	10 (n.s.)	4					
Pancréas (157)	12	13 (n.s.)	↔		33	14 (n.s.)	3		11 (n.s.)	8	14 (n.s.)	8	8 (n.s.)	2	14 (n.s.)	4	17 (n.s.)	8					
Mortalité selon la cause																							
<i>78. Taux ajusté de mortalité selon la cause (p. 100 000) 1994-1998</i>																							
Toutes causes (CIM-9: 000-999)	726	788 (+)	↘		1 960	839 (+)	166		774 (+)	541	823 (+)	500	768 (n.s.)	225	784 (+)	191	759 (n.s.)	338					
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	257	263 (n.s.)	↘		634	282 (n.s.)	54		257 (n.s.)	175	279 (+)	165	210 (-)	60	284 (n.s.)	67	267 (n.s.)	113					
Cancers (140-208)	216	243 (+)	↘		627	217 (n.s.)	45		239 (+)	172	271 (+)	171	265 (+)	79	243 (+)	60	212 (n.s.)	99					
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	65	74 (+)	↔		173	107 (+)	20		65 (n.s.)	43	78 (+)	45	79 (+)	22	53 (n.s.)	12	73 (n.s.)	30					
Traumatismes non intentionnels (E800-E949)	27	39 (+)	↘		105	38 (n.s.)	8		36 (+)	28	28 (n.s.)	17	46 (+)	15	57 (+)	15	46 (+)	22					
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	26	28 (n.s.)	↔		69	31 (n.s.)	6		29 (n.s.)	20	31 (n.s.)	18	28 (n.s.)	8	22 (n.s.)	5	27 (n.s.)	12					
<i>79. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (p. 100 000) 1994-1998</i>																							
Cardiopathies ischémiques (410-414)	149	144 (n.s.)	↘		354	168 (n.s.)	33		147 (n.s.)	101	153 (n.s.)	91	109 (-)	31	148 (n.s.)	35	142 (n.s.)	62					
Maladies vasculaires cérébrales (430-438)	45	53 (+)	↘		124	58 (n.s.)	11		45 (n.s.)	30	58 (+)	33	41 (n.s.)	11	57 (n.s.)	13	62 (+)	25					
Maladies des artères (440-448)	14	17 (+)	↘		42	17 (n.s.)	3		17 (n.s.)	11	20 (+)	12	14 (n.s.)	4	16 (n.s.)	4	19 (n.s.)	7					
Insuffisance cardiaque (428)	15	15 (n.s.)	↔		34	20 (n.s.)	4		13 (n.s.)	9	14 (n.s.)	8	14 (n.s.)	4	22 (n.s.)	5	12 (n.s.)	5					
<i>80. Taux ajusté de mortalité par cancers (p. 100 000) 1994-1998</i>																							
Poumon (162)	65	77 (+)	↔		200	63 (n.s.)	14		69 (n.s.)	50	91 (+)	59	87 (+)	26	76 (n.s.)	19	68 (n.s.)	32					
Sein, chez la femme (174)	32	35 (n.s.)	↔		51	31 (n.s.)	4		37 (n.s.)	16	40 (n.s.)	14	40 (n.s.)	7	32 (n.s.)	4	26 (n.s.)	7					
Côlon et rectum (153-154)	26	29 (n.s.)	↔		74	24 (n.s.)	5		30 (n.s.)	21	35 (+)	22	33 (n.s.)	9	26 (n.s.)	6	22 (n.s.)	10					
Prostate (185)	29	27 (n.s.)	↔		24	14 (n.s.)	1		32 (n.s.)	8	28 (n.s.)	6	39 (n.s.)	4	27 (n.s.)	3	16 (-)	2					
Pancréas (157)	11	12 (n.s.)	↔		31	12 (n.s.)	2		12 (n.s.)	9	12 (n.s.)	7	15 (n.s.)	4	13 (n.s.)	3	10 (n.s.)	5					
Estomac (151)	9	12 (+)	↘		31	14 (n.s.)	3		13 (+)	9	14 (+)	9	9 (n.s.)	3	14 (n.s.)	3	9 (n.s.)	4					

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec	Saguenay-Lac-St-Jean				La Baie			Chicoutimi			Jonquière			Domaine-du-Roy			Maria-Chapdelaine			Lac-Saint-Jean-Est		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	Indic	Test	N/an	
	A	A	B	C	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D	A	B	D
ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)																							
<i>81. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (p. 100 000) 1994-1998</i>																							
Maladies pulmonaires obstructives chroniques (490-496)	37	47 (+)	↔		112	55 (+)	11		42 (n.s.)	28	49 (+)	29		39 (n.s.)	11		42 (n.s.)	10		56 (+)	23		
Pneumonies et gripes (480-487)	19	20 (n.s.)			45	42 (+)	8		18 (n.s.)	11	21 (n.s.)	12		26 (n.s.)	7		8 (-)	2		14 (n.s.)	6		
<i>82. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels (p. 100 000) 1994-1998</i>																							
Accidents de véhicules-moteurs (E810-E819)	10	17 (+)	↔		49	11 (n.s.)	3		19 (+)	15	11 (n.s.)	7		17 (+)	5		25 (+)	7		22 (+)	11		
Chutes accidentelles (E880-E888)	8	10 (+)	↔		22	19 (+)	3		8 (n.s.)	5	10 (n.s.)	6		8 (n.s.)	2		8 (n.s.)	2		10 (n.s.)	4		
<i>83. Taux ajusté de mortalité par suicide (p. 100 000) 1994-1998</i>																							
	19	21 (+)	↗		63	24 (n.s.)	6		22 (n.s.)	18	20 (n.s.)	15		20 (n.s.)	7		24 (n.s.)	7		20 (n.s.)	11		
<i>84. Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (p. 100 000) 1994-1998</i>																							
Toutes causes (CIM-9: 000-999)	6 022	6 886 (+)			3 794	6 000 (n.s.)	286		7 072 (+)	1 080	6 736 (+)	893		7 060 (+)	453		7 012 (+)	376		7 016 (+)	707		
Cancers (140-208)	1 839	2 053 (+)			1 131	1 722 (-)	79		2 077 (+)	318	2 199 (+)	297		2 128 (+)	134		2 154 (+)	114		1 882 (n.s.)	188		
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	1 136	1 202 (+)			656	1 119 (n.s.)	51		1 239 (+)	188	1 320 (+)	177		850 (-)	54		1 297 (+)	66		1 198 (+)	119		
Traumatismes non intentionnels (E800-E949)	686	1 019 (+)			579	574 (-)	29		1 016 (+)	160	634 (-)	81		1 372 (+)	91		1 491 (+)	87		1 266 (+)	131		
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	210	217 (+)			119	285 (+)	13		217 (n.s.)	32	228 (+)	31		223 (n.s.)	14		122 (-)	6		222 (+)	23		
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	168	177 (+)			96	137 (-)	6		250 (+)	38	189 (+)	26		177 (n.s.)	11		62 (-)	3		124 (-)	12		
Santé dentaire																							
<i>85. Indice de surfaces de dents permanentes cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 2^e et 6^e année (%) 1998-1999</i>																							
2 ^e année scolaire	5,8	9,0 (+)			—	n.d.	—		n.d.	—	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		
6 ^e année scolaire	1,9	2,6 (+)			—	n.d.	—		n.d.	—	n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		n.d.	—		
ÉTAT DE SANTÉ MENTALE																							
<i>86. Population de 18 ans et plus dont la détresse psychologique dépasse le seuil symptomatologique (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>																							
Sexes réunis	10,7	10,4 (n.s.)	↔		22 637	8,0 {n.s.}	1 472		12,5 {+}	7 612	11,8 {n.s.}	6 112		9,3 {n.s.}	2 358		7,8 {n.s.}	1 643		8,7 {n.s.}	3 410		
Hommes	n.d.	6,9 s.o.			7 364	2,8 s.o.	258		8,8 s.o.	2 585	6,1 s.o.	1 543		5,6 s.o.	702		4,7 s.o.	498		8,9 s.o.	1 735		
Femmes	n.d.	13,9 s.o.			15 325	12,9 s.o.	1 183		16,2 s.o.	5 059	17,3 s.o.	4 607		12,8 s.o.	1 631		10,9 s.o.	1 149		8,4 s.o.	1 711		
<i>87. Population de 18 ans et plus présentant des idées suicidaires sérieuses et récentes (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>																							
Sexes réunis	3,7	4,4 (n.s.)	↔		9 482	2,0 {-}	370		4,3 {n.s.}	2 616	5,2 {n.s.}	2 693		6,1 {+}	1 544		3,6 {n.s.}	760		3,8 {n.s.}	1 510		
Hommes	3,8	4,7 s.o.			5 016	1,6 s.o.	147		6,4 s.o.	1 880	3,7 s.o.	926		8,8 s.o.	1 098		2,7 s.o.	293		3,6 s.o.	713		
Femmes	3,6	4,1 s.o.			4 520	2,4 s.o.	223		2,3 s.o.	725	6,7 s.o.	1 780		3,7 s.o.	476		4,5 s.o.	468		4,4 s.o.	896		

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observés ou estimation du nombre de personnes concernées.

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

ANNEXE

FICHES MÉTHODOLOGIQUES

1. Population selon l'âge (%) 2004

Définitions : **Population selon l'âge (%) 2004** : Proportion (%) de la population d'un groupe d'âge donné par rapport à la population totale.¹

Âge médian (en années) 2004 : Âge où l'on retrouve de part et d'autre 50% de la population.¹

Indice de dépendance total (%) 2004 : Rapport (%) de la population des 0-14 ans et des 65 ans et plus à celle des 15-64 ans.¹

Indice de dépendance des jeunes (%) 2004 : Rapport (%) de la population des 0-14 ans à celle des 15-64 ans.¹

Indice de dépendance des aînés (%) 2004 : Rapport (%) de la population des 65 ans et plus à celle des 15-64 ans.¹

Indice de vieillesse (%) 2004 : Rapport (%) de la population des 65 ans et plus à celle des 0-14 ans.¹

Rapport de masculinité (%) 2004 : Rapport (%) de la population masculine à la population féminine.¹

Source : Institut de la Statistique du Québec (ISQ), *Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, 2001-2026, édition 2003*, janvier 2005.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 160, indicateur no 2.

2. Taux d'accroissement de la population (%) 1996 à 2001

Définition : Rapport (%), pour une période donnée, de la différence d'effectifs de population au début et à la fin de la période, à la population au milieu de la même période.¹

Sources : Statistique Canada, Recensement 1996, données géocodées, fichier R02TSB01, Beyond 20/20; Statistique Canada, Recensement 2001, produit no 95F0486XCB01001 au catalogue, Ottawa, diffusion juillet 2002.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 158, indicateur no 1.

3. Indice synthétique de fécondité (enfants par femme) Qc : 1997-1999; SLSJ : 1999-2001

Définition : Nombre moyen d'enfants qu'aurait une cohorte de femmes dans l'hypothèse où ces femmes seraient soumises tout au long de leur période de procréation aux taux de fécondité par âge observés durant une période donnée. L'Indice synthétique de fécondité peut être interprété comme le nombre moyen d'enfants par femme.¹

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 166, indicateur no 4.

4. Population de 15 ans et plus vivant seule (%) 2001

Définition : Proportion (%) des personnes de 15 ans et plus vivant seules dans leur logement par rapport au total des personnes de 15 ans et plus dans les ménages privés.¹

Source : Statistique Canada, Recensement 2001, produit no 95F0315XC01001 au catalogue, Ottawa, diffusion janvier 2004.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 176, indicateur no 9.

5. Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (%) 2001

Définition : Proportion (%) des personnes de 65 ans et plus vivant en ménages privés, par rapport au total des personnes de 65 ans et plus.¹

Source : Statistique Canada, Recensement 2001, produit no 95F0314XCB01001 au catalogue, Ottawa, diffusion janvier 2004.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 178, indicateur no 10.

6. Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait (%) 2001

Définition : Proportion (%) de la population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait, par rapport à la population totale de 15 ans et plus.^{1,2}

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 170, indicateur no 6.

2. Le nombre d'individus composant la catégorie «Autres» a été déduit en croisant les données sur l'état matrimonial (légal) et celles sur les unions libres, soit en soustrayant le nombre de personnes mariées à celui des personnes ne vivant pas en union libre.

7. Population selon la langue maternelle (%) 2001

Définition : Proportion (%) de la population selon la langue maternelle, par rapport à la population totale excluant les pensionnaires vivant en institution.¹

Sources : Statistique Canada et MSSS, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2001, tableaux C773_T03A et C773_T03B, diffusion mars 2005.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 180, indicateur no 11.

2. La catégorie « français » regroupe les individus dont la langue maternelle est le français uniquement ou le français et une autre langue (dans la presque totalité des cas, le français est, de fait, la seule langue maternelle). La catégorie « anglais » regroupe les individus dont la langue maternelle est l'anglais uniquement ou l'anglais et une autre langue.

8. Immigrants (%) 2001

Définition : Proportion (%) d'immigrants reçus, par rapport à la population totale excluant les pensionnaires vivant en institution.¹

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001; Compilation et traitement : ISQ, 2003; Estimation pour les territoires sociosanitaires La Baie, Chicoutimi et Jonquière : DSP-02 du SLSJ, Service recherche, connaissance, surveillance.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 182, indicateur no 12.

9. a. Population de 20 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur au certificat d'études secondaires (%) 2001

Définition : Proportion (%) de la population de 20 à 64 ans ayant atteint un niveau de scolarité primaire (complété ou non) ou secondaire non complété par rapport à la population totale de 20 à 64 ans, excluant les pensionnaires vivant en institution.^{1, 2}

Sources : Statistique Canada et MSSS, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2001, tableaux C773_T05A et C773_T05B, diffusion mars 2005.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 184, indicateur no 13 avec la modification ci-après.
2. Compte tenu des données disponibles, nous référons à la population de 20 à 64 ans pour cet indicateur.

b. Population de 20 ans et plus ayant un diplôme universitaire (%) 2001

Définition : Proportion (%) de la population de 20 ans et plus ayant obtenu un diplôme universitaire par rapport à la population totale de 20 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution.¹

Sources : Statistique Canada et MSSS, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2001, tableaux C773_T05A et C773_T05B, diffusion mars 2005.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 184, indicateur no 13 avec la modification ci-après.
2. Compte tenu des données disponibles, nous référons à la population de 20 à 64 ans pour cet indicateur.

10. Revenu personnel par habitant (moyenne en dollars courants) 2003

Définition : **Revenu personnel par habitant** : Rapport, pour une année donnée, du revenu personnel total de l'ensemble de la population d'un territoire donné à la population totale de ce territoire au milieu de la même année.^{1, 2} Le revenu personnel se définit comme étant la somme de tous les revenus des ménages provenant de leur participation aux activités de production (rémunération des salariés, revenu net des exploitants agricoles et revenu net des entreprises individuelles) et il inclut les revenus de placement ainsi que les transferts courants, dont ceux des administrations publiques.

Revenu personnel disponible par habitant : Rapport, pour une année donnée, du revenu personnel total disponible de l'ensemble de la population à la population totale au milieu de la même année.^{1, 2} Le revenu personnel disponible par habitant équivaut au revenu personnel moins les impôts directs et les cotisations payées aux administrations publiques.

Source : ISQ, Direction des statistiques économiques et sociales, 2005.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 192, indicateur no 17.
2. Le chiffre qui apparaît pour le territoire correspond au revenu personnel moyen dans la sous-région Saguenay. L'ISQ ne fournit les données que par MRC ou territoire équivalent, soit la MRC-du-Fjord et Ville Saguenay. Une somme pondérée selon le poids démographique de ces deux entités dans la sous-région Saguenay a été calculée pour obtenir le revenu personnel moyen dans la sous-région Saguenay.

11. Rapport de dépendance économique (\$ par 100 \$ de revenu d'emploi) 2002

Définition : Représente les paiements de transferts gouvernementaux par tranche de 100 \$ de revenu d'emploi total d'un territoire donné.¹

Le rapport de dépendance économique permet d'évaluer la redistribution des revenus par l'État et d'évaluer la dépendance relative des gens à l'égard des transferts gouvernementaux.

Source : Statistique Canada, Division des données régionales et administratives, *Profil de dépendance économique, 2004*.

Note : 1. Le chiffre qui apparaît pour le territoire correspond au rapport de dépendance économique de la sous-région Saguenay. L'ISQ ne fournit les données que par MRC ou territoire équivalent, soit la MRC-du-Fjord et Ville Saguenay. Une somme pondérée selon le poids démographique de ces deux entités dans la sous-région Saguenay a été calculée pour obtenir le rapport de dépendance économique de la sous-région Saguenay.

12. Population vivant sous le seuil de faible revenu (%) 2001

Définitions : **a) Sous le seuil** : Proportion (%) de la population dans les ménages privés vivant sous le seuil de faible revenu (SFR) par rapport à la population totale dans les ménages privés.

b) À moins de 50 % du seuil : Proportion (%) de la population dans les ménages privés vivant à moins de 50 % du seuil de faible revenu (SFR) par rapport à la population totale dans les ménages privés.¹

Selon Statistique Canada, le SFR ne doit pas être considéré comme un seuil de pauvreté. Il permet plutôt d'identifier la proportion de la population qui s'en tire moins bien au plan économique.

Source : Statistique Canada et MSSS, série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2001, tableaux C773_T07A et C773_T07B, diffusion mars 2005.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 194, indicateur no 18.

13. Adultes de 18 à 64 ans prestataires du programme d'assistance-emploi (%) 2004

Définition : Proportion (%) de la population du groupe d'âges spécifié ayant bénéficié d'une prestation d'assistance-emploi, pour un mois d'une année donnée, par rapport à la population totale du groupe d'âges.^{1, 2, 3}

Sources : NUMÉRATEUR : MESSF, Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, mars 2004 (mise à jour juin 2004).

DÉNOMINATEUR : Institut de la Statistique du Québec, *Perspectives démographiques, Québec et ses régions, 2001-2051, édition 2003*.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 196, indicateur no 19.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapelaine.
3. Le nombre total de prestataires adultes pour la région est inférieur de 367 à la somme des prestataires adultes des territoires socio-sanitaires. Cette différence est due au fait que les données par territoire socio-sanitaire produites par le MESSF incluent une partie des prestataires adultes vivant en institution (hébergés), ce qui n'est pas le cas pour les données par région produites par le même ministère.

14. Répartition des adultes prestataires du programme d'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (%) 2004

Définition : Proportion (%) des adultes bénéficiant d'une prestation d'assistance-emploi pour un mois donné selon le nombre d'années cumulatives depuis 1975 où ils recevaient des prestations, par rapport à la population adulte bénéficiant d'une prestation d'assistance-emploi pendant ce mois.^{1, 2, 3}

Les personnes de moins de 18 ans qui sont soutien de famille (6 cas dans la région en 2004) sont incluses dans les données.

Sources : NUMÉRATEUR : MESSF, Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, mars 2004 (mise à jour juin 2004).

DÉNOMINATEUR : Institut de la Statistique du Québec, *Perspectives démographiques, Québec et ses régions, 2001-2051, édition 2003*.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 198, indicateur no 20.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Pour chaque sous-catégorie, le nombre de prestataires dans les territoires est sous-estimé en raison des données manquantes dans le fichier (réf. indicateur 13, note 3).

15. Personnes de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (%) 1999

Définition : Proportion (%) de la population de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti, durant un mois donné, par rapport à la population de 65 ans et plus recevant une prestation de sécurité de la vieillesse durant le même mois.^{1, 2}

Source : DRHC, Sécurité de la vieillesse (INSPQ, 2001).

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 200, indicateur no 21.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

16. Taux d'emploi (%) 2001

Définition : Proportion (%) de la population de 15 ans et plus occupée, par rapport à la population totale de 15 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution.^{1, 2}

La population occupée est composée des personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, qui, au cours de la semaine de référence, avaient fait un travail quelconque contre rémunération ou à leur compte (de une heure jusqu'à sept jours entiers) ou étaient temporairement absentes de leur travail ou de l'entreprise toute la semaine à cause de vacances, d'une maladie, d'un conflit de travail (grève ou lock-out), ou encore pour d'autres raisons (Statistiques Canada, 1997).

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 188, indicateur no 15.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

17. Taux de chômage (%) 2001

Définition : Proportion (%) de la population de 15 ans et plus en chômage, par rapport à la population active totale de 15 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution.^{1, 2}

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 190, indicateur no 16.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

18. Population active expérimentée selon le secteur d'activité (%) 2001

Définition : Proportion (%) de la population de 15 ans et plus occupant un emploi, selon le secteur d'activité, par rapport à la population totale active expérimentée de 15 ans et plus.^{1, 2}

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 186, indicateur no 14.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

19. Population selon la source d'approvisionnement en eau potable (%) Qc : 1999; SLSJ : 2001

Définition : Proportion (%), pour une année donnée, de la population selon la source d'approvisionnement en eau potable, par rapport à la population totale.¹

Ne sont ciblés par cet indicateur que les réseaux municipaux. Cependant, les populations desservies par un service privé sont incluses car celles-ci peuvent occasionnellement s'approvisionner au réseau public. Par contre, les populations estivales ne sont pas incluses.

Sources : NUMÉRATEUR : Ministère de l'Environnement du Québec, Système informatisé eau potable, avril 2003.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 284, indicateur no 63. La population est estimée et ajustée pour l'année 2003, à partir des données du Système informatisé eau potable du MENV.

20. Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale (%) 1998

Définition : Proportion (%) de la population se déclarant insatisfaite de sa vie sociale, par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2}

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 298, indicateur no 69.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

21. Familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille (%) 2001

Définition : Proportion (%) de familles de recensement avec au moins un enfant jamais marié de 17 ans ou moins selon la structure de la famille, par rapport au total des familles de recensement avec au moins un enfant jamais marié de 17 ans ou moins.¹

Source : Statistique Canada, Recensement 2001, produit no 95F0316XCB01001 au catalogue, Ottawa, diffusion janvier 2004.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 172, indicateur no 7.

22. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent selon l'âge (%) 2001

Définition : Proportion (%) selon l'âge, d'enfants jamais mariés de 17 ans ou moins vivant dans des familles de recensement composées d'un parent seul, par rapport à la population totale d'enfants jamais mariés de 17 ans ou moins vivant dans les familles de recensement.¹

Sources : Statistique Canada et MSSS série de tableaux géocodés tirés du recensement de 2001, tableaux C773_T04A et C773_T04B, diffusion mars 2005.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 174, indicateur no 8.

23. Taux de grossesse à l'adolescence (p. 1 000) 1997-1998

Définition : Rapport (pour 1 000), pour la période donnée, du nombre annuel moyen de grossesses d'adolescentes du groupe d'âges spécifié, à la population du groupe d'âges au milieu de la période.

Le nombre de grossesses regroupe l'ensemble des événements suivants ayant fait l'objet de déclaration : les naissances vivantes, les mortinaissances survenues après au moins 20 semaines de gestation, les interruptions volontaires de grossesse (IVG) pratiquées en clinique ou à l'hôpital et les avortements spontanés. Les avortements spontanés qui ne nécessitent pas d'intervention médicale, généralement ceux survenant après une très faible durée de gestation, échappent au calcul.^{1,2}

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des naissances vivantes et fichier des mortinaissances; RAMQ, fichiers des services professionnels rémunérés à l'acte.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 224, indicateur no 33.

2. Compte tenu du nombre élevé de cas d'IVG non répartis par territoire dans les fichiers 1997 et 1998 (163 cas associés à des jeunes filles âgées de moins de 20 ans), nous avons estimé le nombre de cas en appliquant le taux régional à la population féminine concernée pour chacun des territoires.

24. Population de moins de 18 ans ayant subi de la violence physique (%) 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 17 ans et moins ayant subi un geste de violence sévère dans l'année précédant l'enquête par rapport à la population de 17 ans et moins vivant en ménages privés.^{1,2}

Source : DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

2. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

25. Taux d'incidence des nouvelles prises en charge des 0-17 ans dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (p. 1 000) 1993-1999

Définition : Rapport (pour 1 000), pour une période donnée, du nombre annuel moyen de nouvelles prises en charge décidées dans chaque centre jeunesse (CJ) dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), à la population des 0 à 17 ans au milieu de la même période.^{1,2}

Sources : NUMÉRATEUR : Banque de données communes CJ-LPJ, rapports statistiques annuels (INSPQ, 2001).
DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 230, indicateur no 36.

2. Le nombre de prises en charge décidées étant dépendant des ressources disponibles pour assurer ces prises en charge, cet indicateur informe davantage sur la disponibilité des ressources que sur l'ampleur de la problématique, qu'il sous-estime.

26. Taux de jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois (p. 1 000) 2001

Définition : Rapport (pour 1 000), pour une année donnée, du nombre de jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois fédérales ou provinciales, à la population totale de jeunes de 12 à 17 ans au milieu de la même année.^{1,2}

Sources : NUMÉRATEUR : MSP, Statistiques 2001 sur la criminalité au Québec, tableau 1.12 (MSP, 2002)

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 232, indicateur no 37.

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

27. Taux de crimes contre la personne (p. 100 000) 2001

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre annuel moyen d'infractions criminelles perpétrées contre la personne, à la population totale au milieu de la même année.

Selon le ministère de la Sécurité publique, les études de victimisation ont démontré qu'une portion importante de la criminalité n'est jamais rapportée aux autorités.^{1,2}

Sources : NUMÉRATEUR : MSP, Statistiques 2001 sur la criminalité au Québec, tableau 2.1 (MSP, 2002)

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 234, indicateur no 38.

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

28. Taux de victimisation pour violence conjugale chez les femmes de 12 ans et plus (p. 100 000) 2002

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre de femmes de 12 ans et plus victimes de violence dans un contexte conjugal, à la population totale des femmes de 12 ans et plus pour la même année. Dans tous les cas, les délits commis doivent avoir fait l'objet d'un signalement aux corps policiers et avoir été jugés fondés après enquête policière, même s'ils ne se sont pas traduits par une mise en accusation. Selon le ministère de la Sécurité publique, les études de victimisation ont démontré qu'une portion importante de la criminalité n'est jamais rapportée aux autorités.^{1,2}

Sources : NUMÉRATEUR : pour le Québec et la région ; MSP, La violence conjugale, statistiques 2002, tableau 26, page 50-51 et tableau 28, page 53-54. Le nombre estimé par an pour chacun des territoires a été calculé en appliquant les taux régionaux par groupes d'âge aux effectifs de population par groupes d'âge en 2002 de chacun des territoires.

DÉNOMINATEUR : Pour le Québec, données compilées par l'Institut de la Statistique du Québec pour le ministère de la sécurité publique du Québec. Pour la région et les territoires ; Projections de population selon le territoire de réseau local de services (RLS), le sexe et l'année d'âge, au 1 juillet, 2001 à 2026, Institut de la statistique du Québec (ISQ), janvier 2005.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 236, indicateur no 39.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

29. Taux de victimisation pour violence conjugale chez les hommes de 12 ans et plus (p. 100 000) 2002

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre d'hommes de 12 ans et plus victimes de violence dans un contexte conjugal, à la population totale d'hommes de 12 ans et plus pour la même année. Dans tous les cas, les délits commis doivent avoir fait l'objet d'un signalement aux corps policiers et avoir été jugés fondés après enquête policière, même s'ils ne se sont pas traduits par une mise en accusation. Selon le ministère de la Sécurité publique, les études de victimisation ont démontré qu'une portion importante de la criminalité n'est jamais rapportée aux autorités.^{1,2}

Sources : NUMÉRATEUR : pour le Québec et la région ; MSP, La violence conjugale, statistiques 2002, tableau 26, page 50-51 et tableau 28, page 53-54. Le nombre estimé par an pour chacun des territoires a été calculé en appliquant les taux régionaux par groupes d'âge aux effectifs de population par groupes d'âge en 2002 de chacun des territoires.

DÉNOMINATEUR : Pour le Québec, données compilées par l'Institut de la Statistique du Québec pour le ministère de la sécurité publique du Québec. Pour la région et les territoires ; Projections de population selon le territoire de réseau local de services (RLS), le sexe et l'année d'âge, au 1 juillet, 2001 à 2026, Institut de la statistique du Québec (ISQ), janvier 2005.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 236, indicateur no 39.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

30. Femmes de 18 ans et plus ayant subi de la violence conjugale (p. 1 000) 2000

Définitions : Proportion (pour 1 000) des femmes de 18 ans et plus ayant subi des paroles et des gestes de violence au cours des douze mois précédant l'enquête, par rapport à la population féminine totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1,2} Trois types de violence ont été considérés.

a) **Violence psychologique ou agression verbale**: paroles et gestes symboliques visant à induire une peine ou une crainte psychologique et à intimider la victime.

b) **Violence physique mineure**: certaines actions ou gestes d'agression peu dangereux pour la santé physique de la victime.

c) **Violence physique sévère**: certaines actions ou gestes d'agression dangereux qui portent gravement atteinte à l'intégrité physique d'une victime (ces comportements constituent des voies de fait et sont justiciables en vertu du Code pénal).

Ces échelles de mesure sont documentées en détail dans Straus (1999).

Source : DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
2. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

31. Hommes de 18 ans et plus ayant subi de la violence conjugale (p. 1 000) 2000

Définition : Proportion (pour 1 000) des hommes de 18 ans et plus ayant subi des paroles et des gestes de violence au cours des douze mois précédant l'enquête, par rapport à la population masculine totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1,2} Trois types de violence ont été considérés. Ils sont définis à l'indicateur précédent.

Source : DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
2. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

32. Population de 18 à 74 ans percevant avoir des habitudes alimentaires médiocres (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 à 74 ans percevant avoir des habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises, par rapport à la population totale des 18 à 74 ans dans les ménages privés.^{1,2,3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 202, indicateur no 22. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

33. Fumeurs actuels de 18 ans et plus (%) 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus fumant la cigarette, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.

Les fumeurs actuels comprennent les «fumeurs réguliers» («quotidiens») qui fument au moins une cigarette par jour, tous les jours et les fumeurs occasionnels.^{1, 2, 3}

Sources : DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000; Statistique Canada, Enquête de surveillance sur l'usage du tabac au Canada (ESUTC).

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 206, indicateur no 24. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

34. Fumeurs quotidiens de 18 ans et plus dont l'âge initial du tabagisme quotidien est inférieur à 15 ans (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) des fumeurs qui ont commencé à fumer tous les jours avant l'âge de 15 ans par rapport à l'ensemble des personnes de 18 ans et plus qui fument tous les jours.^{1, 2}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
2. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

35. Fumeurs de 25 cigarettes ou plus par jour chez les 18 ans et plus (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus fumant 25 cigarettes ou plus par jour, par rapport au nombre total de personnes de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. Cet indicateur est similaire à l'indicateur 24 de l'INSPQ (2001 : p. 206). Ce dernier concerne cependant la population de 15 ans et plus; exclut du groupe à risque les personnes qui fument exactement un paquet par jour (25 cigarettes); et se limite aux personnes qui fument chaque jour.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

36. Population de 18 ans et plus ayant cessé de fumer (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) des anciens fumeurs par rapport à l'ensemble des personnes de 18 ans et plus qui fument ou ont déjà fumé.^{1, 2}

Cet indicateur est aussi appelé le taux de cessation tabagique.

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
2. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

37. Population de 18 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus, au cours des sept jours ayant précédé l'enquête, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 208, indicateur no 25. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

38. Population de 18 ans et plus présentant une consommation élevée d'alcool 5 fois ou plus au cours d'une année (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus ayant pris cinq consommations ou plus d'alcool en une même occasion au moins cinq fois au cours des douze derniers mois ayant précédé l'enquête, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 210, indicateur no 26. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

39. Population de 18 ans et plus présentant un excès de poids (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus présentant un excès de poids, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés à l'exclusion des femmes enceintes.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 226, indicateur no 34. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

40. Population de 18 ans et plus ayant des activités physiques de loisir insuffisantes (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus qui n'a fait aucune activité physique ou qui en a fait de 1 à 3 fois par mois (à raison de 20 à 30 minutes par séance), au cours des trois mois précédant l'enquête, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Ces personnes peuvent aussi être qualifiées de sédentaires ou inactives.

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 204, indicateur no 23. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

41. Taux de césarienne (pour 100 accouchements) 1999-2001

Définition : Rapport (pour 100 accouchements), pour une période donnée, du nombre de césariennes, au nombre d'accouchements qui ont eu lieu dans les centres hospitaliers de la région durant la même période.¹

La période 1999-2001 couvre deux années financières. Les accouchements qui ont lieu à domicile, en maison de naissances et dans les centres hospitaliers hors région sont exclus des données.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des hospitalisations MED-ÉCHO.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 258, indicateur no 50.

42. Indice synthétique de grossesse (grossesses par femme) 1997-1998

Définition : Nombre moyen de grossesses qu'aurait une cohorte de femmes dans l'hypothèse où ces femmes seraient soumises tout au long de leur période de procréation aux taux de grossesse par âge observés durant une période donnée.

Le nombre de grossesses regroupe l'ensemble des événements suivants ayant fait l'objet de déclaration : les naissances vivantes, les mortinaissances survenues après au moins 20 semaines de gestation, les interruptions volontaires de grossesses (IVG) pratiquées en clinique ou à l'hôpital et les avortements spontanés. Les avortements spontanés qui ne nécessitent pas d'intervention médicale, généralement ceux survenant après une très faible durée de gestation, échappent au calcul.^{1, 2}

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des naissances vivantes et fichier des mortinaissances; RAMQ, Fichiers des services professionnels rémunérés à l'acte.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 164, indicateur no 3.
2. Compte tenu du nombre élevé de cas d'IVG non répartis par territoire dans les fichiers 1997 et 1998 (472 IVG), le calcul de l'indice synthétique de grossesse à l'échelle locale n'a pas été effectué.

43. Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004

Définition : Proportion (%), pour une période donnée, de naissances vivantes de poids insuffisant pour l'âge gestationnel, par rapport au total des naissances vivantes dont le poids et l'âge gestationnel sont connus, durant la même période.

Un nouveau-né ayant un retard de croissance intra-utérine est un nouveau-né dont le poids est insuffisant compte tenu de son âge gestationnel. Cette notion s'appuie sur des courbes de croissance in-utéro.

Le calcul de l'indicateur ne s'applique qu'aux naissances vivantes simples et gémellaires dont l'âge gestationnel se situe entre 22 et 42 semaines. Les combinaisons improbables d'âge gestationnel et de poids à la naissance ainsi que les naissances dont le poids est inférieur à 500g sont également exclues.¹

Sources : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 222, indicateur no 32.

44. Naissances de faible poids (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004

Définition : Proportion (%), pour une période donnée, de naissances vivantes de poids inférieur à 2 500 grammes, par rapport au total des naissances vivantes dont le poids à la naissance est connu, durant la même période.

Les nouveau-nés dont le poids est inférieur à 2 500 grammes sont considérés de faible poids et ceux dont le poids est inférieur à 1 500 grammes sont considérés de très faible poids (OMS, 1990).¹

Sources : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 218, indicateur no 30.

45. Naissances prématurées (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004

Définition : Proportion (%), pour une période donnée, de naissances vivantes d'âge gestationnel inférieur à 37 semaines révolues, par rapport au total des naissances vivantes dont l'âge gestationnel est connu, durant la même période.¹

Sources : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 220, indicateur no 31.

46. Répartition des naissances selon la scolarité de la mère (%) Qc : 2000-2002; SLSJ : 2002-2004

Définition : Répartition (%), pour une période donnée, des naissances vivantes selon le nombre d'années de scolarité de la mère, par rapport au nombre total des naissances vivantes dont la scolarité de la mère est connue durant la même période.

Le nombre d'années de scolarité correspond au plus haut niveau de scolarité complété avec succès.¹

Sources : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 216, indicateur no 29.

47.0 Dépenses *per capita* en services de santé (\$) 2002-2003

Définition : Dépenses réelles brutes affectées à la mission santé et services sociaux par année financière divisées par le nombre d'habitants.

Source : Données financières du MSSS : <http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/statisti/statinternet.nsf/15fcven3a4dc217f2a852568e20053b19b/e2e4f7a27d3ab0c585256e77006cb591?opendocument&highlight=0,capita>

47. Taux de participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans (%) 2001

Définition : Rapport (%), pour une année donnée, du nombre de participants de 0 à 9 ans au programme de services dentaires pour les enfants, au nombre total d'enfants de 0 à 9 ans inscrits à la RAMQ et admissibles au programme de la même année.¹

Source : RAMQ, (2002). Statistiques annuelles 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 272, indicateur no 57.

48. Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie (%) 1999-2000

Définition : Proportion (%) des femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie ou plus, au cours d'une période de deux ans, par rapport à la population totale de femmes de 50 à 69 ans.¹

Source : Centre d'expertise en dépistage (INSPQ), données juillet 2002.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 276, indicateur no 59. Les données proposées ici proviennent des données de facturation à la RAMQ et non des Enquêtes de Santé Québec (ISQ). Elles concernent les femmes qui ont passé une mammographie tous types confondus : dépistage ou diagnostic.

49. Femmes de 15 ans et plus ayant subi un test de PAP (%) 1998

Définition : Proportion (%) de femmes de 15 ans et plus ayant subi un test de dépistage du cancer du col utérin (test de PAP ou test de Papanicolaou) au cours de la période de deux ans ayant précédé l'enquête, par rapport à la population totale de femmes de 15 ans et plus dans les ménages privés.^{1,2}

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 274, indicateur no 58.

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

50. Personnes de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe (%) Qc : 2001-2002; SLSJ : 2002-2003

Définition : Proportion (%) de personnes de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe au cours de la campagne annuelle de vaccination (novembre à février) par rapport à la population totale de 65 ans et plus dans les ménages privés.¹

Sources : NUMÉRATEUR (SLSJ) : DSP-02, Bilan de la campagne de vaccination contre l'influenza et le pneumocoque 2002-2003, (Gagnon L., 2003).

DÉNOMINATEUR (SLSJ) : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

INDICATEUR QUÉBEC : Priorités nationales de santé publique 1997-2002, 5^e bilan, (MSSS, 2003).

Note : 1. INSPQ (2001), p. 278, indicateur no 60. Les données proposées ici proviennent de rapport administratif et non des Enquêtes de Santé Québec (ISQ).

51. Population ayant consommé trois médicaments différents et plus (%) 1998

Définition : Proportion (%) de la population totale ayant consommé trois médicaments différents et plus durant la période de deux jours ayant précédé l'enquête, par rapport à la population totale dans les ménages privés.^{1,2}

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 280, indicateur no 61.

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

52. Population de 15 ans et plus qui a utilisé Info-Santé CLSC (%) 1998

Définition : Proportion (%) de la population de 15 ans et plus qui a utilisé le service Info-Santé CLSC au cours d'une année, par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.^{1,2}

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, compilations spéciales réalisées par la direction Santé Québec : variables ISSAV ET ISFREQRR.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 270, indicateur no 56.

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

53. Personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (%) 2001

Définition : Proportion (%) de la population de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale de 15 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution.^{1,2}

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 282, indicateur no 62.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

54. Nombre de médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale par 100 000 habitants

Définitions : **a) Inscrits à la RAMQ au 31 décembre 2001** : Rapport (pour 100 000) du nombre de médecins ou de dentistes et spécialistes en chirurgie buccale, à la population totale correspondante de la même année. Seuls les dispensateurs (médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale) qui ont demandé un paiement à la RAMQ au cours de l'année sont pris en considération dans le calcul de l'indicateur.¹

b) Médecins actifs résidants au 31 mars 2003 : Rapport (pour 100 000), pour une année donnée, du nombre de médecins tel que comptabilisés par la RRSS-02 au plan des effectifs médicaux, à la population totale correspondante de la même année.

Les médecins comptabilisés sont ceux qui combient un des différents postes autorisés en vertu du plan régional d'effectifs médicaux. Il s'agit donc de médecins qui sont installés dans la région; qui détiennent la plupart du temps un statut de membre actif dans un des établissements du SLSJ et qui ont une pratique jugée «active» dans la région.

Sources : NUMÉRATEUR a : RAMQ, Statistiques annuelles 2001, tableau 2.23 (RAMQ, 2002).

NUMÉRATEUR b : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

DÉNOMINATEUR a : RRSS-02, Évolution du nombre de médecins spécialistes et omnipraticiens au Saguenay-Lac-St-Jean (02), Compilations régionales, DCS, avril 2003.

DÉNOMINATEUR b : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 264, indicateur no 53.

55. Taux de participation de la population en médecine et chirurgie (%) 2001

Définition : Rapport (%), pour une année donnée, du nombre de participants âgés d'un an et plus en médecine et chirurgie ainsi que pour certains services de laboratoire pour un type de service particulier, au total des personnes inscrites et admissibles à la RAMQ âgées d'un an et plus au 1^{er} juillet de la même année.

Au sens de la RAMQ, les participants sont les personnes inscrites au fichier et admissibles au régime d'assurance-maladie ayant reçu au moins un service durant l'année. Les enfants de moins d'un an sont exclus en raison des délais d'inscription au fichier.¹

Sources : NUMÉRATEUR : RAMQ, Statistiques annuelles 2001, tableau 2.15 (RAMQ, 2002).

DÉNOMINATEUR : RAMQ, Statistiques annuelles 2001, tableau 1.01 (RAMQ, 2002).

Note : 1. INSPQ (2001), p. 266, indicateur no 54.

56. Pourcentage de séjours excessifs à l'urgence (%) 2001-2002

Définition : Proportion (%) de personnes ayant occupé une civière à l'urgence pendant 24 heures et plus, durant une période donnée, par rapport au nombre total de personnes ayant occupé une civière à l'urgence durant la même période.¹ Dans le calcul des pourcentages, sont exclus du dénominateur les patients dont la durée de séjour sur une civière à la fin d'un semestre n'est pas terminée.

Les données sont traitées sur la base des années financières (1^{er} avril au 31 mars).

Source : MSSS, Clientèle sur les civières à l'urgence, synthèse des données par clientèle, par période, par établissement, 2001-2002 et 2002-2003.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 250, indicateur no 46.

57. Taux d'hospitalisations jugées évitables (p. 10 000) 1996-2001

Définitions : **a) Taux brut total** : Rapport (pour 10 000), pour une période donnée, du nombre annuel moyen total d'hospitalisations jugées évitables en soins physiques de courte durée, à la population totale moyenne de la même période.¹

b) Taux selon la condition médicale : Rapport (pour 10 000), pour une période donnée, du nombre annuel moyen d'hospitalisations en soins physiques de courte durée pour une condition médicale donnée, à la population annuelle moyenne du groupe d'âge associé à la condition médicale de la même période.

Les conditions médicales jugées évitables peuvent être traitées dans un contexte de soins de première ligne. Une augmentation des hospitalisations pour ces conditions peut traduire une diminution de l'accès aux services de première ligne.¹

L'univers actif des soins physiques de courte durée exclut les hospitalisations pour troubles mentaux, les hospitalisations des nouveau-nés en bonne santé, les chirurgies d'un jour, les soins de longue durée, les hospitalisations de type « hôpital à domicile », celles des non-résidents québécois et celles de longue durée dans des unités de soins de courte durée.

Les codes CIM-9 des 14 conditions médicales retenues apparaissent entre parenthèses.

Les données sont traitées sur la base des années financières (1^{er} avril au 31 mars).

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des hospitalisations MED-ÉCHO.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 260, indicateur no 51. Nous avons retenu toutes les hospitalisations en soins de courte durée quel que soit le type de CH afin d'inclure les hospitalisations de courte durée dans les CH dont la vocation première est l'hébergement et les soins de longue durée (ex.: CHSLD Cléophas-Claveau). Par ailleurs nos fichiers n'incluaient pas les hospitalisations hors Québec.

58. Durée moyenne de séjour en soins physiques de courte durée (journées d'hospitalisation) 1999-2001

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de journées d'hospitalisation, pour un regroupement de causes d'hospitalisation, au nombre d'hospitalisations, pour le même regroupement, durant la même période.¹

Mêmes précisions qu'à l'indicateur précédent concernant l'univers actif des soins physiques de courte durée.

Les codes CIM-9 pour chaque cause retenue apparaissent entre parenthèses.

Les données sont traitées sur la base des années financières (1^{er} avril au 31 mars).

Source : MSSS, Fichiers des hospitalisations MED-ÉCHO.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 240, indicateur no 41.

59. Taux d'interventions dites pertinentes (p. 10 000) 1998-2001

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen d'interventions dites pertinentes pratiquées chez les personnes de 18 ans et plus, à la population annuelle moyenne de 18 ans et plus de la même période. Les interventions dites pertinentes font référence à des interventions nécessitant une hospitalisation et dont les bénéfices sont importants pour la qualité de vie.¹

Les interventions sont définies à partir de la Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux. Les codes apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des hospitalisations MED-ÉCHO.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 256, indicateur no 49. Dans nos données, les hospitalisations hors Québec ne sont pas incluses.

60. Taux de mortalité évitable (p. 100 000) 1994-1998

Définitions : **a) Taux brut total** : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès évitables, à la population annuelle moyenne âgée de moins de 65 ans de la même période.¹

b) Taux selon la cause : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès pour une cause évitable donnée, à la population annuelle moyenne du groupe d'âge associé à la cause évitable pour la même période.¹

La sélection des maladies repose sur deux principes généraux: des interventions connues et efficaces existent et des soins appropriés peuvent être dispensés.¹

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès et fichier des mortinaissances.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 262, indicateur no 52.

61. Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (%) 2000-2001

Définition : Rapport (%) pour une année financière donnée, du nombre d'hospitalisations observées pour les résidents d'un territoire donné (SLSJ ou territoire) ayant été traités dans leur territoire de résidence, au nombre total d'hospitalisations des résidents de ce territoire, quel que soit le lieu du traitement, durant la même année financière.¹

L'univers actif des soins physiques de courte durée exclut les hospitalisations pour troubles mentaux, les hospitalisations des nouveau-nés en bonne santé, les chirurgies d'un jour, les soins de longue durée, les hospitalisations de type « hôpital à domicile », celles des non-résidents québécois et celles de longue durée dans des unités de soins de courte durée.

Source : MSSS, Fichiers des hospitalisations MED-ÉCHO.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 242, indicateur no 42. Nous avons retenu toutes les hospitalisations en soins de courte durée quel que soit le type de CH afin d'inclure les hospitalisations de courte durée dans les CH dont la vocation première est l'hébergement et les soins de longue durée (ex.: CHSLD Cléophas-Claveau). Par ailleurs le fichier n'incluait pas les hospitalisations hors Québec.

62. Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (%) 2000-2001

Définition : Rapport (%) pour une année financière donnée, du nombre d'hospitalisations observées pour les résidents d'une région donnée ayant été traités dans leur région de résidence, au nombre total d'hospitalisations enregistrées dans cette région, quel que soit le lieu de résidence, durant la même année financière.¹

Mêmes précisions qu'à l'indicateur précédent concernant l'univers actif des soins physiques de courte durée.

Source : MSSS, Fichiers des hospitalisations MED-ÉCHO.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 244, indicateur no 43. Mêmes précisions qu'à l'indicateur précédent.

63. Taux d'admission dans un CHSLD (pour 100 lits) Qc : 1999; SLSJ : 2002

Définition : Rapport (pour 100 lits) du nombre de personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) au cours des 12 mois précédant une date de référence, au nombre de lits gérés par le système régional d'orientation-admission à cette date de référence.¹

La date de référence est le 1^{er} septembre.

Sources : NUMÉRATEUR (QUÉBEC) : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

NUMÉRATEUR (SLSJ) : ADRLSSS-02, application Accès-CHSLD, septembre 2002.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 254, indicateur no 48.

64. Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un CHSLD (en jours) Qc : 1999; SLSJ : 2002

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre de jours d'attente des personnes admises au cours des 12 mois précédant une date de référence, au nombre de personnes admises durant la même période dans un CHSLD.¹

La date de référence est le 1^{er} septembre.

Sources : NUMÉRATEUR (QUÉBEC) : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

NUMÉRATEUR (SLSJ) : ADRLSS-02, application Accès-CHSLD, septembre 2002.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 254, indicateur no 48.

65. Population de 65 ans et plus en institution de santé (%) 1996

Définition : Proportion (%) des personnes de 65 ans et plus en institution de santé, par rapport au total des personnes de 65 ans et plus.¹

Source : Statistique Canada, Recensement 1996, données géocodées, tableaux 0296 et 0496.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 252, indicateur no 47.

66. Population de 18 ans et plus percevant son état de santé comme médiocre (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus se percevant en moyenne ou mauvaise santé, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 290, indicateur no 65. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

67. Espérance de vie à la naissance (en années) 1995-1999

Définition : Nombre moyen d'années que peut espérer vivre un nouveau-né dans l'hypothèse où les taux de mortalité par âge observés durant une période déterminée demeurent stables dans le temps.¹

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 326, indicateur no 81.

68. Espérance de vie en bonne santé - sans limitations d'activités (en années) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Nombre moyen d'années à vivre en bonne santé à la naissance dans l'hypothèse où les taux par âge d'incapacité, de mortalité et d'institutionnalisation, observés durant une période déterminée demeurent stables dans le temps.¹

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000 ; MSSS, Fichiers des décès; Statistique Canada, Recensement 1996, données géocodées, tableau 0496; MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 328, indicateur no 82.

69. Taux de mortalité selon l'âge (p. 100 000) 1998-2002

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès, pour un groupe d'âges spécifique, à la population annuelle moyenne de ce groupe d'âges de la période.¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 2001, sexes réunis.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 330, indicateur no 83.

70. Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 1995-1999

Définition : Rapport (pour 1 000 naissances vivantes), pour une période donnée, des décès d'enfants de moins d'un an, aux naissances vivantes. La mortalité infantile peut être subdivisée en trois composantes : néonatale précoce, néonatale tardive et post-néonatale.

L'OMS recommande d'exclure du calcul les naissances vivantes et les décès infantiles de moins de 500 grammes. Au Québec, tous les décès infantiles et toutes les naissances vivantes sont inclus dans le calcul du taux de mortalité infantile, peu importe le poids à la naissance.¹

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Fichiers des naissances vivantes.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 332, indicateur no 84.

71. Mortalité périnatale (pour 1 000 naissances totales) 1995-1999

Définition : Rapport (pour 1 000 naissances totales), pour une période donnée, de la somme des mortinaissances et des décès d'enfants de moins de 7 jours, aux naissances totales (mortinaissances et naissances vivantes).

Le taux de mortinatalité correspond au rapport du nombre des mortinaissances aux naissances totales.

Au Québec, tous les décès périnataux de même que les naissances vivantes sont inclus dans le calcul, peu importe le poids à la naissance ou la durée de gestation.¹

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès et fichier des mortinaissances.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Fichiers des naissances vivantes et des mortinaissances.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 334, indicateur no 85.

72. Population ayant une limitation d'activités à long terme (%) 1998

Définition : Proportion (%) de la population ayant une limitation d'activités à long terme, par rapport à la population totale dans les ménages privés.^{1,2}

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 320, indicateur no 78.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

73. Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MADO) (p. 100 000) Qc : 1995-1999; SLSJ : 1997-2001

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, du nombre de nouveaux cas de maladies infectieuses à déclaration obligatoire, à la population annuelle moyenne de la même période.

Les données représentent des événements et non des individus.¹

Sources : NUMÉRATEUR : INSPQ, Laboratoire de santé publique du Québec (DSP-02, 2002).

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 316, indicateur no 76.

74. a. Prévalence des principaux problèmes de santé (%) 1998

Définition : Proportion (%) de la population présentant au moins un problème de santé dans une catégorie donnée de problèmes, par rapport à la population totale dans les ménages privés.^{1,2}

Selon Santé Québec, les problèmes déclarés peuvent être des maladies ou des affections de courte ou de longue durée ou simplement des symptômes. Dans environ 80 % des cas, les problèmes rapportés auraient été confirmés par un médecin.

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 292, indicateur no 66.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

b. Prévalence du diabète (% ajusté selon l'âge) 2001-2002

Définition : Proportion (%), pour une année financière, de la population de 20 ans et plus présentant un diabète, estimée à partir de fichiers administratifs de la RAMQ et du fichier MED-ÉCHO. Les prévalences sont ajustées selon la structure par âge de la population du Québec en 2001 pour permettre la comparaison entre les divers territoires géographiques.¹

Source : INSPQ, décembre 2004.

Note : 1. La définition de cas de diabète fait encore l'objet de validation et la méthodologie permettant de les identifier est sujette à changement au fil du temps.

75. Taux ajusté d'hospitalisation selon le diagnostic principal (p. 100 000) 1998-2001

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période financière donnée, du nombre annuel moyen d'hospitalisations en soins physiques de courte durée, selon le diagnostic principal, à la population annuelle moyenne de la même période.

Le diagnostic principal correspond à l'affection la plus importante présentée par le malade durant son hospitalisation. Ce diagnostic est, de façon générale, étroitement relié à la raison d'hospitalisation. Le diagnostic principal est défini selon la CIM-9. Les codes des catégories retenues apparaissent entre parenthèses.¹

L'univers actif des soins physiques de courte durée exclut les hospitalisations pour troubles mentaux, les hospitalisations des nouveau-nés en bonne santé, les chirurgies d'un jour, les soins de longue durée, les hospitalisations de type « hôpital à domicile », celles des non-résidents québécois et celles de longue durée dans des unités de soins de courte durée.

Les données sont traitées sur la base des années financières (1^{er} avril au 31 mars).

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des hospitalisations MED-ÉCHO.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 304, indicateur no 72. Nous avons retenu toutes les hospitalisations en soins de courte durée quel que soit le type de CH afin d'inclure les hospitalisations de courte durée dans les CH dont la vocation première est l'hébergement et les soins de longue durée (ex.: CHSLD Cléophas-Claveau). Par ailleurs nos fichiers n'incluaient pas les hospitalisations hors Québec.

76. Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels (p. 10 000) 1998-2001

Définition : Rapport (pour 10 000), pour une période financière donnée, du nombre annuel moyen d'hospitalisations en soins physiques de courte durée pour traumatismes non intentionnels selon la catégorie de traumatisme, à la population totale au milieu de la même période.

Les catégories de traumatismes non intentionnels sont obtenues à partir du code d'accident. Le code d'accident est défini selon la CIM-9 et correspond à la cause extérieure responsable du traumatisme ou à l'effet subi par le bénéficiaire et à l'origine de son admission au centre hospitalier. Les codes pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.¹

Les mêmes précisions qu'à l'indicateur précédent concernant l'univers actif des soins physiques de courte durée s'appliquent.

Les données sont traitées sur la base des années financières (1^{er} avril au 31 mars).

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des hospitalisations MED-ÉCHO.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 308, indicateur no 73.

77. Taux ajusté d'incidence des cancers (p. 100 000) 1997-2001

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des nouveaux cas de cancers, à la somme des populations annuelles de la même période.¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 2001, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des tumeurs du Québec.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 310, indicateur no 74.

78. Taux ajusté de mortalité selon la cause (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels, pour une cause spécifique, à la somme des populations annuelles de la même période.¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 336, indicateur no 86.

79. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par maladies de l'appareil circulatoire, à la somme des populations annuelles de la même période.¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 342, indicateur no 88.

80. Taux ajusté de mortalité par cancers (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par tumeurs malignes, à la somme des populations annuelles de la même période.¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 340, indicateur no 87.

81. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par maladies de l'appareil respiratoire, à la somme des populations annuelles de la même période.¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 344, indicateur no 89.

82. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par traumatismes non intentionnels, à la somme des populations annuelles de la même période.¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 346, indicateur no 90.

83. Taux ajusté de mortalité par suicide (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des décès annuels par suicide, à la somme des populations annuelles de la même période.¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 348, indicateur no 91.

84. Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport (pour 100 000), pour une période donnée, de la somme des années de vie perdues avant 75 ans, à la population moyenne âgée de moins de 75 ans.¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 350, indicateur no 92.

85. Indice des surfaces de dents permanentes cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 2^e et 6^e année (%) 1998-1999

Définition : Rapport (%) de la somme des surfaces des dents cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 2^e et 6^e année, au nombre total d'enfants examinés de 2^e et 6^e année scolaire.¹

Source : Enquête de santé dentaire (INSPQ, 2001).

Note : 1. INSPQ (2001), p. 294, indicateur no 67.

86. Population de 18 ans et plus dont la détresse psychologique dépasse le seuil symptomatologique (%) Qc : 1987; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus se situant dans la catégorie « Symptomatologie élevée » (30 points ou plus) au cours de la semaine de référence, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1,2}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. L'indice de détresse psychologique reprend l'un des indicateurs de santé mentale utilisés par Santé Québec dans son enquête de 1987. Il s'agit d'une échelle de mesure, utilisée couramment en épidémiologie psychiatrique et en recherche clinique, construite à partir du Psychological Symptom Index (PSI) décrivant divers états symptomatiques et construite d'après 29 énoncés (Ilfeld, 1973, 1978).

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

87. Population de 18 ans et plus présentant des idées suicidaires sérieuses et récentes (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (%) de la population de 18 ans et plus ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours des douze derniers mois (y compris les personnes ayant tenté de se suicider durant la même période), par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1,2,3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 302, indicateur no 71. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus. De plus, dans le calcul de prévalence des idéations suicidaires récentes, nous avons inclus, contrairement à ce que fait l'INSPQ, les personnes ayant tenté de s'enlever la vie au cours de la même période.

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires sociosanitaires en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

BIBLIOGRAPHIE

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE (2002), *Maladies à déclaration obligatoire, rapport annuel 2001*, RRSS-02, 24 p.

GAGNON, L. (2003), *Bilan de la campagne de vaccination contre l'influenza et le pneumocoque 2002-2003*, RRSS-02, Direction de santé publique, 39 p.

ILFELD, F.W. (1978), *Psychologic Status of Community Residents along Major Demographic Dimensions*. Archives of General Psychiatry, 35: 716-724.

ILFELD, F.W. (1976), *Further Validation of a Psychiatric Symptom Index in a Normal Population*. Psychological Reports, 39: 1215-1228.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ), M. PAGEAU, R. CHOINIÈRE, M. FERLAND ET Y. SAUVAGEAU (2001), *Le Portrait de santé Le Québec et ses régions*, édition 2001, Les Publications du Québec, 432 p.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ) (2003), *Revenu personnel selon les régions administratives, les régions métropolitaines de recensement et les MRC*, Collection l'Économie.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP) (2001), *La violence conjugale, Statistiques 2000*, Direction des affaires policières et de la prévention de la criminalité, Service de la recherche et de la lutte au crime organisé, 67 p.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP) (2002), *Statistiques 2001 sur la criminalité au Québec*, Direction des affaires policières et de la prévention de la criminalité, Direction générale des affaires policière, de la prévention et des services de sécurité, 82 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS) (2003), *Priorités nationales de santé publique 1997-2002, 5^e bilan*, Gouvernement du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 261 p.

RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ) (2002), *Statistiques annuelles 2001*, Gouvernement du Québec.

STATISTIQUE CANADA (1997), *Dictionnaire du recensement de 1996*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-351), 490 p.

STRAUS, M. (1999), *Handbook for the Conflict Tactics Scales (CTS) Including Revised Versions CTS2 and CTSPC*. Family Research Laboratory, University of New Hampshire, Durham.